

後園學入門

外
五卷下

#1336609111

V.12

編註醫學入門 五卷下

外科

腦脛部

癰疽總論

九十一
癰疽發五種

百
頭瘡

百
風屑

百
白禿

百
軟癬

百
大頭腫

百
鬚疽

百
耳瘡

附侵淫瘡月蝕瘡

百
內疳瘡

百
疥腮

百
瘰癧

百
瘰癧核

百
癰瘤

手部

百
疔

百
甲疽

百
代指

頁
天蛇頭

頁
鷲掌風

頁
紅絲瘡

頁
胸腹部

頁
乳癰

頁
肺癰痿

頁
心癰附脇

頁
胃癰

頁
腸癰

頁
腹癰

背腰部

百
背發七種

百
腰發二種

腎腿部

百
腎癰附腎蛆瘡

百
便毒

百
路岐

百
懸癰

附穀道

百
痔

百
漏

百
陰瘡

百
陰囊癰

附小兒陰囊

百
婦人陰瘡

附交接上寒濕瘡

百
杖瘡

附骨疽

附腿上一切寒濕瘡

足膝部

八^百鶴膝風

八^百入面瘡

八^百腎臟風瘡

九^百臙瘡

九^百腳跟瘡

附脚肚瘡

十^百腳發

十^百嵌甲瘡

十^百脚指了瘡

十^百脚背發

遍身部

十一^百五疥

十二^百五癬

十三^百血風瘡

十三^百癩風

十四^百楊梅瘡

十五^百疔瘡

十六^百多骨疽

十七^百翻花瘡

十七^百流注

十七^百癰

十八^百癰

十八^百暑熱瘡

十八^百癰瘰瘡

十八^百寒冷瘡

十八^百凍瘡

十九^百手足皸

十九^百蝸瘡

十九^百癰瘡

十九^百侵淫瘡

十九^百白蛇纏

十九^百湯火瘡

十九^百肥瘡

十九^百疔瘡

二十^百漆瘡

二十^百竹木刺

二十^百折傷

二十^百破傷風

至九十一葉小兒門也誤附此卷

等

肉丸英實大每服一丸用針挑於燈焰上燒存性乳汁或
米泔冷水任化下此藥清鎮專主吐逆及瀉太人亦宜

肉虛朱音為腎怯吐瀉五內俱虛有失音者乃腎怯也食

少氣陷損胃陽吐瀉久不止者乃清氣下陷胃口陽虛飲

散虛渴者錢氏白朮散但食即吐先除積內傷乳食面色青白發熱

乳食用取積消導實利胃腸如嘔甚者只用白豆蔻砂仁

下者宜或燒針丸亦妙冷氣入胃嘔吐不已者四君子

湯加白豆蔻砂仁肉豆蔻山藥為末或蜜丸每下錢木瓜

紫蘇煎湯下脾胃虛弱逆痰含哭飲乳食物停滯不散

腹滿嘔吐嬰兒乳者四君子湯加南星砂仁丁香藿香冬瓜
子姜煎服或啓脾丸嘔而不止痰涎在喉有聲將欲驚
者二陳湯加丁香藿香或抱龍丸主之因驚氣逆而吐
者太溫驚丸吐而湯水不納者五苓散
吐涎痰熱者
白玉餅下之冷者溫之有吐沫或白綠水者胃冷也理中

九或半夏陳粟米等分姜煎服○吐稠涎及血者肺熱也
久則肺虛阿膠散加我○吐沫水者後必虫痛安虫丸
漆二分雄黃巴霜各一錢為末糊丸黍米大每五七丸或
廿丸發時取東行石榴根煎湯痛甚苦練根或煎黃煎湯
下量兒大小服之○經年吐乳眼慢黃幾有筋膜者乃父
母交感時喫乳所致宜益黃散五疳保童丸九乳因驚
因積因氣滯因濕滑青者慢驚防
外感與治吐同
之如桶散遺四君子湯加訶子木香陳皮肉豆蔻姜煎服
兼進固腸丸或真人養臟湯或殺石子丸加乳香肉豆蔻
選用○瀉青色者乃夾驚木尅土也益黃散太溫驚丸主
之有初起黃變青或瀉藥物直過者尤為寒瀉三五次即
困急用附子理中湯或肢冷只鼻氣亦冷故依慢驚慢脾
若觀音散加全蝎天麻防風羌活甚者用金液丹為末煎
生薑米飲調灌多服乃效候胃氣已生手足漸暖癰癥猶
在若球用金液丹合青州白丸等分服之兼用異攻散
理中丸鈎藤散轉驚丸調理雖至危者往往死中得生金
液丹真小兒吐瀉之妙劑也蓋小兒吐瀉皆當溫補若已

虛損尤當速生胃氣惟尋常時行瀉症不可遽投熱藥
瀉止痢作無疑若患瘡瀉青乃毒去無害不必服藥

五疳

五疳由積虛而成

疳者乾也瘦瘠少血也五疳病關五臟
二十歲以下曰疳二十歲以上曰癆始

因乳食太過或乳母喜飲房勞後即與兒乳或飯粥肉食
太早肥甘不節而成間有傷寒病後久吐久瀉久渴痞積
疹痘雜症妄施吐下內亡津液而成者要皆脾胃虛弱血
氣枯滯生積生熱生痰乘臟氣之虛傳入為疳間有熱者
亦虛熱耳故治熱不可妄表
過涼治虛不可峻溫緊補
內熱中滿病初萌
經曰數食

熱數食其令人中滿言病之始也凡嬰兒乳食停滯稍覺
飽滿內煩不安虛者必須扶胃而兼消導實者必先疎利
而後和胃不可因循以致積久成疳又有熱滿
未甚便施蘆薈胡連龍膽苦寒傷胃反致疳者
內疳痞結

漸黃瘦外鼻赤爛瘡瘻生

疳症初患中滿久則結痞初患
內熱久則外潮令人肌膚黃瘦

或耳鼻生瘡或遍身生瘡受喫泥炭土米鹹酸雜果食不
消化不便不清大便反利大藥熱痔多見外症冷痔多見
內症○痔症鼻頭有瘡不着痂漸連耳生瘡宜用白及輕
粉各二分烏賊魚骨三分為末先以漿水洗拭乾糝或鼻
下赤爛自搽者用蘭香葉燒灰二分銅青半分輕粉少許
為末乾糝○痔症遍體生瘡不歇乃虫內耗精髓外蝕皮
膚宜連升丸黃連七兩水濕透納雄猪肚內用線緊縫飯
上蒸十分爛取出和少蒸飯搗丸小豆大每二三十九米
飲下仍以川芎生地茯苓茯神與之調血清心或蘆薈丸
肥兒丸生犀散選用間服外以大夫皮苦參白芨煎湯洗
後却用訶子帶皮核燒灰入麝香輕粉熱痔身熱大便秘
少許為末敷之自幼小以至弱冠皆同
痔病初起人未瘦怯但臉赤口臭唇焦煩渴朝熱如火大
便秘澀者為熱痔宜胡連丸胡黃連川黃連各五錢辰砂
一錢半為末入猪膽內繫定懸於鉢內用深漿煮一炊
飯久取出入蘆薈末二錢麝香少許粳米飯丸麻子大每
五七丸茶清下下方有青蠶蝦蟆灰各二錢○熱痔黃冷
瘰癧目遇夜不見或生瘡者五福化毒丹陳粟米飲下

痺身涼渴不停痺病久則目腫面紅體瘦煩渴多汗腹脹

宜至聖丸丁香各一錢木香厚朴史君子陳皮肉冷

熱相兼泄且秘或時便血或潮熱冷熱二症交互非就非

和胃滋血調氣淡薄飲食久則自然堅牢如聖丸主之胡

黃連川黃連蕪荑史君子各一兩麝香五分爲末用蝦蟇

五箇搗碎酒熬成膏和丸麻子大每五七丸或二十丸入

參煎湯下常服錢氏白朮散以生津液蓋痺本濕熱久則

寒濕全在驚痺面赤盜汗渴安神退熱滋衛榮驚痺即心

虛血弱神不安舍更如乳食不調心臍積熱所致外症腹

赤唇紅口舌生瘡胃膈煩悶小便赤澀五心皆熱盜汗發

渴齧齒驚悸宜茯神丸茯神薑黃琥珀棗連赤茯苓各三

錢遠志用黑豆水煮去骨鈎藤皮蝦蟇灰各二錢菖蒲一

錢麝香少許爲末粟米糊丸麻子大每十丸

薄荷煎湯下○輕者硃砂安神丸太溫驚丸風痺涼血與

順氣搖頭揉目便多青

風疳即肝疳多因胎風更加乳食不調肝臟受熱或乳母外感內傷

邪氣未散遇與乳兒所致外症搖頭揉目白膜遮睛或赤

腫眵淚爛弦痛痒雀目昏暗甚至經月眼合名曰疳眼汗

流合面而卧肉色青黃髮立筋青腦熱羸瘦宜生熟地黃

丸加常歸煎服或黃連肥兒丸中梔煎湯下○疳眼赤熱

體瘦脇疼便青一切肝症風疳丸青黛黃連天麻五靈脂

夜明砂川芎蘆薈各二錢龍膽草防風蟬退各一錢半全

蝎二枚乾蟾頭三錢為末猪膽汁浸糕丸麻子大食疳痞

每十丸薄荷煎湯下如脇硬眼角見黑氣者難治

脹多澹泄磨積退黃脾漸寧

食疳即脾疳由乳食傷而後傷脾氣孤弱或乳母恣食牛

冷肥膩或酒飯後即與乳兒久則變為乳癖腹脇結塊各

日乳疳外症黃瘦腹脹氣促瀉臭合睡食減吃泥宜益黃

散消乳食丸或肥兒丸加義木青皮陳皮○肚大青筋者

小胡連丸胡黃連五分去果積阿魏一錢半去肉積神變

去食積黃連去熱積各二錢麝香一微為末氣疳咳血或

猪膽汁和丸黍米大每丹丸白木煎湯下

聲亞退熱化痰肺自清

氣喘即肺病原因傷寒傷風汗後勞復更加乳食不調以致肺氣受

傷外症鼻下兩傍瘡痒不痛或鼻流臭汁内生息肉或汁

所流處隨即成瘡各曰瘡墮不時咳嗽氣逆寒熱喘紅壯

瀉多涕揉鼻咬甲與癆症大同宜先服清肺湯黃芩當歸

麥門冬連翹防風赤茯苓桔梗生地紫蘇并草煎胡各五

分桑白皮一錢水煎服次服化蠶丸蕪荑蘆薈青黛川芎

白芷胡黃連川黃連蝦蟆灰各等分爲末猪膽汁浸糯米

麻子大每廿丸食後臨卧杏仁煎湯下其鼻常用熊膽泡

湯小筆蘸洗俟前藥各進數服再用青黛當歸赤小豆瓜

蒂地榆黃連蘆薈各等分雄黃少許爲末入鼻欬瘡○瘡

亞不能發聲者用黃連肥兒丸十五粒蘇合香丸一粒硃

砂五靈脂各少許爲末

腎痺耳焦天柱倒齒脫手足冷如

水腎痺又名急痺言五痺惟腎爲最急也多因痘後餘毒

未清更加乳食不調甘味入脾而生蟲狀似傷寒脈或

上齲齒齲則口齋出血臭氣甚則齒齲潰爛齒黑脫落頭

有灰者名曰走馬疳言陽明熱氣上奔如馬然下齲腸胃

則下痢肝爛即後痔痢外症腦熱肌削手足如米爪黑面

紫身多瘡疥寒熱時作甚者天柱骨倒俱宜腎氣丸加史

君子川練肉○走馬痔并痘毒牙痛者濁白散或用白芷

五錢馬牙硝一錢銅青五八分麝香一字為末乾敷口角及

豫齒又有諸般難治症日痔乾痔渴痔癆痔瀉痔痢痔腫

上效皆五痔之危症日蛔痔腦痔脊痔

無辜痔丁系痔暗露痔皆五痔死症所以然者五臟俱病故也

用痔乾啼眼不轉睛痔搭口癰眼口乾作渴肺痔聲焦

皮燥大便並結腎痔身熱肢公小便乾澀古方通用連膽

九黃連五錢猪膽汁浸瓜蒌根烏梅蓮肉杏仁各二錢為

末牛膽汁浸糕丸麻子大每十五丸烏梅姜蜜煎湯下如

五乾俱見身上粟生色斑黑者必死痔渴遇夜還稍止痔渴臟中宿有痔氣

灸燭酒麯以致小兒心肺壅熱日則煩渴引飲乳食不進夜則渴止宜連膽丸如飲水不止舌黑者即死痔癆

潮汗咳瀉成痔癆骨蒸五心潮熱盜汗咳嗽泄瀉肚硬如

石面色如銀斷不可治古方八物湯去白朮

加黃芪柴胡陳皮半夏史君子蝦蟆灰驚甲各等分并實煎服或連膽丸香連猪肚丸加蝦蟆灰救之如氣促者即

死
痔瀉額上青紋見
痔瀉毛乾唇白額上青紋肚脹腸鳴泄下糞粕忌用熱藥止之宜香薷丸

黃連三錢木香肉豆蔻訶子砂仁茯苓各一錢為末飯九黍米大每五九米飲下如滑瀉脫肛飢逆者死速下**痔**

痢五色濕邪
痔痢見有痔疾加之傷食及感冷熱不調以致痢下五色裏急後重宜香砂九黃連

三錢木香厚朴夜明砂砂仁各二錢訶子一錢為末粳飯九麻子大每十五九姜艾煎湯下如入中平滿者必死

痔腫中虛毒氣併
痔腫脹者虛中有積積毒與脾氣相併故令肚腹脹由是脾復受邪故令頭

面手足浮腫宜退黃丸肥兒丸○服甚者揭左子蘿藦子一兩陳皮青皮檳榔黑丑五靈脂赤茯苓我朮各五錢木

香二錢半為末麪糊丸菜豆大每十五九桑白皮紫蘇煎湯或蘿蔔煎湯下治小兒乳食不消心腹脹滿嘔逆氣急

或腸鳴泄瀉腹中冷痛食積乳癖瘰癧氣痞結積聚腸胃或秘或利頭面浮腫兼治五痔小痢肌瘦腹大者如神一方

白胡椒黃連三稜苦練根各二錢半○痔瘻腹皮緊者回
太異者散加五靈脂為末紫蘇煎湯下少茶紫霜丸

痔虫出難為清蛔痔因缺乳腸飯肉食太早腸胃停蓄甜
膩化為蛔虫多啼嘔沫腹痛唇紫腸頭及

齒痒蛔雖食虫却不可動動從口鼻出者難治凡痔
積久莫不有虫形狀不一黃白赤者可醫青黑者死

願腫髮作穗腦痔因胎中素挾風熱生下乳食越常或臨
產犯房以致滿頭餅瘡腦熱如火髮結作穗

願腫願高龜身多汗宜龍膽丸龍膽草升麻苦練根防風
赤茯苓蘆薈油髮灰青黛黃連各等分為末猪膽泥浸糕

丸麻子大每旦九薄荷紫蘇煎
湯下食後仍以蘆薈末入鼻

痔脊蝕脊鋸齒形

脊毒虫
蝕脊脊

骨如鋸齒拍背如鼓鳴十指背生瘡
颯咬爪甲煩熱黃瘦下利宜蘆薈丸

因烏羽古方評無辜痔腦項邊有核轉動軟而不疼中有
虫如米粉不速破之則虫隨熱氣流散

蝕臟腑以致肢體癱瘓便利膿血壯熱癰瘦頭露骨高初
起可用針破膏藥貼之或因浣兒衣時夜露瘡下為蟬烏

落羽所汚兒着此衣重入皮膚故也其衣用火烘之則無

此恙宜月蟾丸用癩蝦蟆一箇打殺置桶中以尿浸之却

取糞蛆一杓入內任其食二日夜取出以布袋繫於急流

水中浸一宿瓦上焙乾入麝香一字為末飯丸麻子大每

卅丸米飲下一服更煩退再丁癰腹大手足小項極小伶

仃也癰腹大也甚者死高肉削臍

突頭哭胃脘或生瘰癧愛喫生米

熱性來頭骨分開飲食吐虫煩渴嘔噦骨瘦後層露形苦

死蓋丁癰哺露皆因脾胃久虛不能消化水穀以致榮衛

氣弱肌肉消瘠腎氣不足復為風冷所傷形體瘦露亦有

胎中受毒臟腑少血所致盡皆無辜種類難治宜十全丹

救

保童消食堪通用五疳保童丸鰓鯉頭蟾頭熊膽麝香

倍子苦練狼雄黃青黛薑黃胡黃連各等分為末糯米糊

丸麻子大每一丸米飲下治五臟乾疳○五疳消食丸宋

君子麥芽陳皮蕪荑神麩草龍膽黃連山查各等分為末

陳米飯丸黍米大每十丸米飲下消疳殺虫退熱磨積進

兒下利寒熱去來毛髮不澤或因婦人有兒未能行時復有孕使兒飲乳水成此疾宜千金龍膽湯仍以紅紗袋夜明砂與兒佩之

諸積

諸積須分虛與實虛者熱微實熱多

諸積腹脹腹痛甚結癖痞瘕臃腫黃疸以至

八痢等症總皆積之為害虛者渾身微熱或夜間有熱少食神倦抱起如驚實者壯熱肚熱尤甚便閉顯腫喉塞涎鳴華盛熱毒發瘡俱宜木香丸主之虛者少用實者倍服其或變症面黑瀉黑久瀉氣促手心生瘡瘦軟者不治

乳積吐瀉極其臭

止乳瀉乳其氣酸臭皆由滯叫未已飲乳停滯不化得之雖未變發而有痞是

為乳積

氣積嘔逆吐喘過

腹痛嘔吐利如瀉或發熱肚痛體瘦飲食不為肌膚皆由觸忤其

氣積不和不瀉延日

食積面黃肚腹石

腹硬帶熱渴瀉或嘔面黃皆由飲食

無度之積過飽後即
應得之是為食積

行氣消乳食自磨

行氣丸木香檀榔
丁香神枳壳芽松史

君子神麴麥芽各二錢半三錢
莖葉連一錢為末蒸餅丸黍米大每廿九米飲下治氣

積也每汗散去青皮或五味木香散亦好○消乳食丸砂

仁陳皮三錢莖葉神麴麥芽各五錢香附一兩為末糊丸

麻子大每廿九紫蘇煎湯下治乳積食
要知小兒腸胃軟

積甚者消積丸感應元紅九子下之

切戒猛峻傷元和
小兒有積腸胃脆軟忌用毒藥攻擊久

之法調脾和胃緩急次序攻之切勿傷其胃氣

有因下積傷脾反生潮熱變為慢驚者有之

癖病不食但飲乳
凡小兒不食但飲乳飲乳而寒熱如瘧

又咳嗽吐痰者必腹中有癖
寒熱如瘧

因停水
惟癖能發潮熱或寒原因乳食失調以致中脘停

水不能宜行為癖
為痰冷氣搏之結而為癖所以

久瘧多
藏於隱僻脇腹疼
即痞塊與大人積聚同多藏

有之
藏於隱僻脇腹疼
為腹隱僻之患持持作痛久取

癖保安還主

輕者木香九重者取癖丸芽遂荒花牽牛

為末入油巴豆一錢和勻飛麩糊丸麻子大每十二丸姜
蜜煎湯下泄後冷粥補仍與和胃○秘傳保安丸白朮土
炒三兩神麩木香檀榔茯苓三錢史君子厚朴萆薢其草
各一錢蒼朮二兩陳皮枳實人參錢朮各一兩半黃連指
膽汁浸砂仁麥芽益智仁肉豆蔻藿香白豆蔻各五錢為
末蜜丸龍眼大每下丸米飲化下嘔吐姜湯下治小兒五
疳八痢吐瀉肚大青筋面黃肌瘦疳積等症有肉積加山
查喘加蘿蔔子瀉加澤瀉猪苓各一兩○化痞丸木香人
參黃芪當歸桂梗黃連三錢錢朮幣甲夜明砂綠礬枳實
史君子苦練根訶子各一兩蝦蟆炙七錢半為末蜜丸菜
豆大每卅丸米飲下忌生冷雜果發脾之物大人癥瘕去
夜明砂蝦蟆黃連為丸梧子大服治毒消癖進食止瀉和
胃進食○極脾散海蛤粉黃丹硫黃各等分切休日修合
為末用醋調成膏攤布盆內晒乾再研為末一歲兒服一
分空心米飲下取下脾臟如藍汁為効○貼疳膏木紅花
子二錢大黃朴硝山梔石灰各一錢酒醉下塊鷄子大共

鴉成膏用布攤開貼在塊上再用湯熬炙手
怕勒之三日後揭起肉黑如墨是其效也

腹脹由中虛氣作有積實者喘氣惡有積悶亂喘滿為實

積丸積丸子選用必利其積若氣

短喘急者分氣紫蘇飲換蘇子

無積不喘虛宜溫無積

為虛可以溫散六君子湯加白芍乾姜厚朴或大異香

加五靈脂為末紫蘇煎湯下或五苓散誤下脾上下分消其氣

不可妄下誤下面腫及手脚誤下脾主面目胞腫脾主

四肢故誤下腫脹通用塌氣丸胡椒一兩蟬梢五錢為末麝香

作浮腫凡粟米大每五七丸米飲下

腹大加腎虛水氣乘脾太喘者

蘿蔔子大喘氣麝腎氣索危甚黃散塌氣丸救之除腫多

因地氣抽或啼怒傷小腸絡陰核氣結腫大動痛謂之癰

地脈濕傷之俱宜五苓散有風熱囊腫便閉者三白散

有因啼叫不止致冷陰氣下結水實不行或孕婦啼泣過

傷。小兒生下小腸氣開，血水凝聚水上，葉肺故多先喘而
從腫痛，有稀軟者有木硬者，宜行心氣，逐腎邪，利二便，更
無補法。宜桃仁九、桃仁三、鐵線桂、木黃、嘉平、美蓉、牡丹皮
各二錢，為末，蜜丸。麻子大，每五七丸，葱白，木通、青皮入鹽
煎湯下。或煎流氣飲子，下青木香丸。○外治腎囊腫，大葶
物通明，用牡蠣為末，先以津雷塗腫處，次用乾糝。○坐地
被風，及虫蟻吹着，囊腫用彈退煎湯頻洗，或葱地、蚯蚓糞
為末，甘草汁調敷。○風熱外腎暴腫，且硬，或生瘡者，用生
地黃為末，先以葱椒煎湯洗淨，次以津唾調敷。
外腎熱者，鷄子清調敷，或加牡蠣少許，餘詳大科病氣。

脹久不通，痞塞胃，芩連枳梗當斟酌。

宜通上攻，胃腸按之。

則痛時發，壯熱宜芩連枳梗湯，枳殼梗各五分，半生薑
芩、瓜蒌仁、黃連各三分，生薑麥門冬煎服，利去黃涎即安。
熱甚加大黃少許。○厚氣痞塞，胃腸留飲，聚於腹脇，或加
脹滿，手不可近，枳實理中丸去苓，消加瓜蒌根，濕加牡蠣。
脹久虛濕熱生黃，深黃為熱，淡黃胃弱。○中惡停瀉生
熱，熱生黃，名曰黃。

疸治與大人一同有熱者小柴胡湯加麥芽枳實山梔茵陳胃弱者四君子湯或理中湯加茵陳○通用萬金丸蒼朮二兩陳皮厚朴夜明砂各二兩為末用綠礬二兩化水入醋少許煮麪糊或者煮棗肉搗丸棗豆大每五十九粒飲下摩積去黃方加史君子二兩枳實黃連訶子各五錢用巴豆十粒同炒令紫色去巴豆不用再入蝦蟆灰五錢苦練服皮二錢半為丸治痔瘡瘰癧進食止瀉和膏追至五

腹痛面黃只是積

腹痛面黃口中氣溫多嘔長食大便臭者消積丸甚若白下餅一之下後以錢

氏白朮散和胃

○尋常輕者只用平胃散加山查麥芽砂

仁青皮甘草為末每一錢米飲下熱加黃芩寒加吳萸

間有寒熱邪相擊面赤為熱面白寒

感熱依痛者面赤熱四股煩熱口中氣

熱宜四順清涼飲加青皮枳殼或黃芩芍藥湯○感寒

痛者面白或青四股冷甚宜小建中湯或大七氣湯加

桂調蘇合香丸冷熱不調多嘔逆

宜枳殼桔梗青皮陳皮當歸甘草各等分木香煨平

心腹俱痛面眇白
光口中吐沫虫攻的
虫動心痛與癰釣相似但目不斜而

手不搖可化
虫丸主之

八痢本與太科同惟有驚痺屬幼童
八痢冷痢白積熱痢赤積冷熱不調積下

赤白痢黃白積或見五色下無時
度驚痢青積不臭休自痢糞黑如魚腸愈而復作酸痢停積又來腹脹便臭

痛露毒痢下紫
白冷挨積溫脾胃應九挨去其毒然後用

黑血如猪肝
參苓白朮散之類溫和脾胃赤白順氣與和中
順氣則腹痛自止純赤者則裏急自除○純白者

積熱毒也宜道滯湯
或赤或白冷熱不調腹痛後重腸胃虛滑食少困倦宜小駐車九黃連六兩乾姜一兩當歸

二兩阿膠三兩為末醋糊丸黍米大每卅九米飲下
大人亦宜○久不止及酸痢者沒石子九鷄子煎

腫脹渴隨至
脾虛有積積化成痢妄下脾胃重誤補脫肛

色掀紅

熱者黃連阿膠丸薄荷煎○有脹涼藥過度或久痢臟寒脫肛者釣腸丸木香煎湯下或真人養臟

湯○有痢類脫肛黑色生疔者用巴豆壳燒灰芭蕉自然

汁煮入朴硝少許洗軟用清油點三滴放三角白礬煨過

龍骨少許為末乾粉肛頭用芭蕉葉

托上勿令便去出入令木兒抱定

乳教百日內不宜戀膈損胃肺孤危

或因啼叫未定喫乳或飲乳過度以致停

蓄胃膈胃也上干於肺故發咳飲能逆肺胃俱病百日内見者為惡候

熱嗽面赤九葶藶

其

四時感冒嗽者當用參蘇飲惺惺散之類微表

虛者阿膠

散可醫

阿膠七分半白茯苓馬兜鈴糯米各二分半杏仁十粒甘草二分水煎治久嗽肺虛氣促有痰惡心

二三歲時欲斷乳夜靜用藥盡兒眉

畫眉膏山梔炒黑三箇雄黃硃砂輕粉各

少許為末清油調勻候兒睡著濃抹盡兒兩

眉上醒來自不喫乳未効再畫仍用搽乳頭

喘因乳啼未定或挾風冷肺家病

或因啼叫未定與乳與鹹酸以致氣逆不

下或因飲乳過度內挾風冷傷肺而喘或餵乳逆者宜

紫蘇子湯蘇子詞子蘿蔔子杏仁木香人參各等分甘草

青皮各減半

姜煎溫服嘔吐不食胃家虛痰壅發熱火炎盛

嘔吐驚悸困倦

自汗者為虛而赤氣盛發熱者為

實俱二陳湯主之虛加參木熟地苓連

尿白成疳積中熱

尿白如泔脾經有積久則成疳亦兼心

木砂仁各五錢青皮陳皮滑石甘草各二

錢半為末每一錢麥門冬煨心煎湯調服淋瀝有驚氣下

結

十餘歲因驚之候心氣下行小便淋瀝日久三四十次

漸覺黃瘦宜順經散非子琥珀益智仁金毛狗脊白茯苓

石燕各五錢石萎一錢為

末每一錢非湯調日二服

汗多胃快兼驚惕

胃快出汗上至頸下至臍者益黃散有

者木溫驚丸驚熱者小兒驚丸俱壯懶麻黃根煎湯下或全因驚惕盜汗者古止砂散脾胃弱者錢氏白朮散

有氣弱心血盜盜汗不止氣弱體瘦乃心血溢盛為汗非

水煎服以收斂心血如額汗陽虛蒲扇灰頭汗連頸而止

手掌心汗多者亦如之兒純陽或因厚衣而額汗出或睡中盜出者用故蒲扇

燒灰為末每三錢溫酒調服輕者不藥自止如滿口生瘡及久病額汗通體香瓜痰火煩通身汗出者痰火盛也宜

如油者不治驚甲黃柏黃連蘆薈青皮各等分為末用大黃瓜葉一箇

去頭填入諸藥至滿却蓋口用柴插定燄火內煨熟取出

外感

小兒傷寒夾驚食治與大人無異所異者夾陰陽表裏木

科同傷寒左額青紋見肢冷無汗慘顏容錢氏云男子面黃體重女人面

赤端急其呵欠煩悶手背熱人迎脉盛則一也若手足温又有汗面光發熱是傷

風亦左額青紋夾食吐熱兼嘔逆右額角青似小葱右額角青

筋發熱頭額肚腹熱其或兼嘔吐腹痛者傷食也如傷寒

寒熱如瘧起心少食散人參養胃湯夾驚于掌心有汗

青紋先見額當中額正中青紋面色青紅于掌心有汗時

驚驚也脫甲散紅絲散或人參羌活散加姜豨蠃退南星

全蝎白附子麻黃便開加大黃煎調硃砂安神丸或溫驚

而後安心神可也傷寒表初喜隈傷寒惡寒初起未發熱時喜隈人藏身密

衣被若發熱皆晝夜不止俱宜量體汗之太繁太陽症見

巷常冲和湯陽明症見葛根解肌湯少陽症見小柴胡湯

裏熱掀衣便不通

入裏內熱者必揚手擲足口中氣齏壯熱作渴太便不通方敢與調胃承氣湯

或大柴胡湯微下之大柴胡陰症見羌活中桂枝知柏厥陰症見羌活

厚朴少陰症見羌活中桂枝知柏厥陰症見羌活

症見雙解散加羌活天麻羌活白附子蟬退額冷肢厥面

色慘瀉青陰病裏虛空

理中湯甘草乾姜湯甚者四逆湯

緩免動驚痰與蛔虫

傷寒溫補太過以致生痰變作驚風者有之或汗下涼藥太過以致胃寒

變或慢驚及蛔虫

傷風鼻塞氣促亂身熱咳嗽忌大汗

初起

仍喜飲入引衣惡風故也凡傷風治與傷寒亦同但傷風

有汗只宜解肌身熱咳嗽聲重氣促體弱者惺惺散咳熱

盛者參蘇飲發熱盛者人參羌活散天麻防風丸

壯熱者升麻葛根湯此傷風表藥不可誤用麻黃入裏能

食渴且煩便閉大黃方可瀉

入裏與傷寒二同但傷風能食為異如煩渴二便赤黃者

四順清涼飲合小柴胡湯二便閉者大柴胡湯風熱內實者木黃丸○風與滯血留蓄上焦脣腫高起大便秘不通者沒藥散沒藥大黃枳壳桔梗各二分木香甘草各一分姜煎服兼脾肢冷吐瀉攻益黃補後大青散風主肝兼脾則必四肢清冷吐瀉不思乳食不渴者當先以益黃散或理中湯補脾後以大青散發散如身熱能食作渴者當先以大青膏或釣藤散發散後以益黃散補脾如作喘脹者兼用塌氣丸一虛渴者兼用錢氏白朮散肺喘心驚胃畏明各臟見症依此斷兼肺則喘息兼腎則畏明各隨尋常感冒必從輕暑濕大科尤可玩懷補母臟藥選用書云雙解散能治風寒暑濕勞倦然貴加減得宜耳

諸熱

諸病發熱辨其初有發熱不歇鼻塞聲重者為外感表熱屬三陽經有潮熱者似潮有信為裏熱

屬胃有壯熱者遍身向熱不已合蟬咬牙甚則發驚屬心
有風熱者身熱口中氣熱屬肝有痰熱者面赤或腫身熱
喘咳胃膈不和屬肺有溫熱者但溫而不甚熱屬脾有腎
熱者陰囊赤腫釣痛大便閉澀屬腎有驚熱者時聞發熱
即退來日依時發熱或面青汗叫有積熱者五心發熱肚
熱至夜則甚有疳熱者骨蒸盜汗咳嗽有瘧熱者寒熱一
日一發或二三日一發有血熱者晝靜夜熱有變蒸熱者
上唇微腫如卧蠶或有珠泡子有麻痘熱者耳鼻脚稍中
指冷顙赤噴嚏唇紅肌膏稠緊發熱種種相類初起當先
詢問父母已出痘未如未患痘仔細認症蓋痘誤用下
藥必變且真傷寒症亦必表陽症為實陰症虛凡實熱面
症已罷日哺潮熱方臥下之陽症為實陰症虛赤氣銜口
渴唇腫便閉暴喘掀揭露衣似傷寒陽症宜入參活散
參蘇飲通心飲導赤散瀉白散瀉黃散涼肝丸連翹飲甘
露飲生犀散四順清涼飲八正散隨宜選用○凡虛熱面
色青白神緩口冷泄瀉多尿夜出虛汗似傷寒陰症宜惺
惺散虛煩自汗者保元湯六又有乍清乍溫症上熱下冷
未加芍藥浮小麥莢棗煎服

不自如上熱驚惕怫鬱不得自如下冷泄瀉不常敗毒散

三、虛陽浮外熱不退和胃元氣自歸凡發熱表裏已解忽陽浮於外煩熱

大作者當與和其胃氣使陽氣歛而歸元身體自涼參苓白朮散錢氏白朮散天乙丸選用

骨蒸發熱有餘間有稟賦榮衛虛因大病後得者榮衛稟賦弱者宜謹避風寒以護其外調飲食

以養其內俱生犀散或四君子湯加減食積痰熱濕火

盛因飲食得者腹有積痞面色淡黃潮熱腹痛宜磨積調

○因積生熱生痰者二陳湯加升麻葛根白芍人參五味子姜煎服或枳朮丸加陳皮半夏黃連山查神麴為丸服

亦通用梨漿飲最宜梨漿飲青蒿童便浸一宿曬乾柴胡人參黃芩前胡秦艽甘草各一分生

梨或生藕各一片薄荷二葉地黃一寸水煎服治潮熱積熱瘧熱及脾積寒熱○青蒿飲亦妙

痘

痘症不過氣血毒

毒乃胎家染火食穢停蓄臟腑生後而發一發悉歸命門遇歲火運時行傳染

或冬煖遇春夏而發或因傷寒熱病失汗下而變成或因外感風寒內傷生冷而發或因跌撲驚恐蓄血而發發則命門火動煎熬左腎夾脊逆流自頭額而下剋丙火不聚於面全散四肢所稟氣血實則勝毒為順氣血虛則毒勝為逆氣血與毒相等則險凡言順者不必藥治逆者治之無効險者必用藥救首尾一十二日間除初熱三日不等有熱發三五日或十餘日故也自報痘至收膿首尾一十二日中間有不守禁戒以至淹纏又有氣血和者不及三十二日而愈初不症有初症并雜症陰甚拘日數以後分日為初學較言耳陽常變類傷寒任他壞症并瘥症無非邪與毒相殘初熱類傷寒初症自初熱至報痘類傷寒六經三陰三陽症六日已後謂之雜症報痘次至收膿常症也異常謂之變症

水痘瑛疹謂之類症不治謂之壞症餘毒謂之瘡症其間
機軸儼似傷寒但痘毒自裏出表非若傷寒自表入裏所
以治法微異至於痘中百病皆外感內傷邪穢與毒相搏
大法痘未盡出見三陽症宜清肌解毒痘已出齊見三陰
症宜溫中托裏。太陽病惡寒身熱氣急尿赤出不快者
防風荆芥甘草湯三味等分水煎服少陽病乍寒乍熱出
不快者連翹防風甘草湯三味等分水煎服陽明病身熱
目赤便秘滯通肌肉出不快者升麻葛根湯加紫草四肢
出不快者防風芍藥甘草湯三味等分水煎服太陰病腹
滿自利四肢厥逆已出者附子理中湯木香散理中丸少
陰病痘出黑陷口舌腐爛四物湯加紫草紅花厥陰病舌
卷囊縮黃青目青時發厥逆異攻散十全大補湯加附子
凡陽症見於春夏及天晴則順陰症見於秋冬及陰雨則逆
痘象豆形色豆色惟有黑
陷最驚人痘者豆也大小不一無妨惟欲圓滿硬實不宜
陷有皮嫩易破他如紫莢者險如麻子如蠟蟲種
如浮萍不分箇數者逆故曰順其形則順逆其形則逆○
色者五臟精華紅黃綠者為佳痘乃脾土及君相二火所

主黃綠乃脾色正色毒將出也紅亦深色桃紅三分紅中
一分白毒始出也鮮紅則為血熱初起紫者大熱全白者
氣虛毒未出也初起白者大虛灰白者血衰而形屬氣
氣滯也黑者毒滯而血乾也焦褐者氣血結也形屬氣
色屬血形貴充頂色潤身頂形圓滿者天之象也
象也血陰也故色屬乎血頂尖圓滿而不缺陷則氣體天
而常親乎上根寒紅潤而暈外明淨則氣體地而常親乎
下極其形色得平要根活根地圓暈顯有神交會不明形
順也
色反燈影週旋眼法新氣可盈而血不可盈苟或形陷失
親乎下色泛溢而不凝斂則血有餘而反親乎上又有氣
多血少者痘雖凸而四圍無色血多氣少者痘雖陷而四
圍紅紫毒有餘而氣血不足者其痘不發不紅此氣血之
辨也○根即圓暈痘疤曰窠疤圓暈曰根圓暈外曰地
皮白無紅是為交會明白圓暈乃氣血之會形色之神也
蓋包血而成圓者氣之形然必氣與血會而後圓形周爭

附氣而成尿者血之形然必血與氣交而後暈色分明雖
然一元流行而已自氣血凝滯而言謂之形自氣血光華
而言謂之色形中紅色色中有形運用鼓舞形色而言謂
之神○燈影週旋者痘形色雖陰若燈光影與痘根圓單
相為週旋根棠紅活漿影深厚雖陷伏灰紫皆可調治若
根棠不紅不起血死不活漿無影者雖輕難治故雖白日
亦必用麻油紙擦照之自始至終全
以救地為主眼法新巧全在於此
而症惡者必外感寒暑症善而痘惡者必外觸
穢汚痘為主方為難雖無他症而痘惡者必死

表實難出

虛易出

症以身熱無汗為表實痘以紅突為表實症以身
寒汗多為表虛痘以灰陷為表虛蓋無汗則膚膜

開密所以痘稍難出出則紅活綻突多汗則膜理空疎所
以痘反易出出則灰炎頂平有言表實易出者必裏實甚
也表虛難出者裏實順臍虛倒臍吐瀉少食為裏虛裏實
必裏亦虛也
則正氣收毒自痘頂而下漸次結痂者順
裏虛則氣血不能收毒而痘根先腐者逆不綻或淡表裏

墜症既吐瀉汗多痘又輕者從頭至足稀能食便調不須

治重者不食二便耗或瀉脚先頭上或齊至凡出腦從頭

足至頭為逆頭脚齊出齊腦者險所以輕者腦出俱從頭

至足痘亦稀少重者稠密頭上未出未腦脚上先出先腦

然痘以脾土為主自始至終以能食者順脹貫時宜食老

雞補氣收腦時宜食雞鴨收毒或猪精肉肥者功痰滯氣

始終忌魚腥二日一便者為順三四便者為利輕變重者非有效外

感內傷犯汚穢忌風寒忌損表忌暑恐生煩燥忌濕恐腰

恐渴忌酒葱魚羊蒜等忌痒淡食為佳忌煮鷄鷄鴨卵病

人聞氣害目忌柿棗砂糖恐痘瘡入眼忌茶醋猪肝猪血

恐藏黑忌燒香通室以燂血只宜常燒蒼朮猪甲乳香以

避惡氣忌酒色僧人酒淨冷水圍其皮膚大忌父母房室

月水乳母服氣人膏糞汚房內炙燂對梳掃地生人往來

一切惡穢以致氣滯氣聞香則行聞臭則止故也自革

痘至收靨一有感傷穢汚便令當出不出當靨不靨或變黑陷作痛發痒一切雜症○大藥外感冬時五積散去麻黃加桂心紫草春時不換金正氣散加芎芷防風或為風邪所襲者消風散加紫草暑月六一散清暑益氣湯體薄清貴者只用保元湯隨症加減○內傷乳食氣壅遏者二陳湯加山查升麻白朮四君子湯加砂仁木香川芎紫草或枳朮丸宿食重者感應丸傷生冷涼藥者益黃散治中湯○內傷兼外感者調解散加味四聖散○穢汚觸者避穢丹蒼朮細辛甘松乳香降香各等分為末烈火焚之將出者用胡荽泡酒噴帳幃及懸胡荽於帳中甚者以胡荽泡湯化下蘇合香丸但胡荽能通心竅利大腸惟便滑者忌之○穢毒入內黑陷者升麻升白礬生地龍炒各等分為末每五分用小猪尾血調新汲水下不拘時服如體薄者四物湯去地黃加入參黃芪稍連翹白芷甘草稍木香

類症 水痘熱三白出靨俱易眼光華

水痘似正痘仍身熱二三白而出初出即

如赤小豆大皮薄痂結中心圓暈更少易出易脫被濕則難結痂亦不為害外症兩眼如水宜小麥湯滑石甘草地骨皮各一分人參麻黃大黃知母羌活等藥各二分小麥七粒水煎服如瘰癧瘡水痘煩熱溺澀口舌生瘡者八正散關熱發斑或丹毒發斑紅痕如錦紋或如蚊迹與傷寒陽毒身涼紅痕自退再服二日或帶痘反少又有報痘時熱盛發斑者透肌散加紅花黃芩升麻咽痛加玄參磨犀角和服或玄參升麻湯加葛根熱盛者解毒湯加芍藥白芍防風若見黑斑即死水痘膿疱後發斑者亦死斑少者可救報痘時有紅丹如雲額突者敗毒散加紫草紅花黃芩頂解之如腫高紅紫痕者透肌散加黃芩地骨皮蠅退平有水是疹麻疹如粟米微紅隱隱皮膚不出作痒全無腫痛麻即如麻頂平軟不得指印有清水痘多夾疹同出麻亦多夾疹同出故曰痘疹麻疹但痘成膿疱後出疹者反順水痘後出者逆又有先發疹而後發斑者亦無害治疹宜消風熱用敗毒散加葛根升麻白芷表退肌熱則疹自無矣又有報痘後麻疹稠密如熱種者

透肌散加柴胡紅花解之若色好不
可過用涼藥必傷脾胃致陷伏也
麻有夾痘同出者麻

沒痘存色愈加

麻夾痘出者治痘為主麻必先沒而痘獨

為陽易出易沒麻沒後痘必起發形色愈加者順如形色
已旺者四君子湯加芎歸黃芪黑陷者去茯苓更加紫草

木香糯米

入酒煎服麻急理麻痘急理

痘麻痘源頭共一家

雜症熱毒頭亦痛

凡雜症皆因榮衛不和以致毒不泄於

多挾內外邪穢頭痛初起為

風以後多熱毒上攻毒甚則腫眼紅舌胎唇吐詭紅或目

黃肝熱舌上白胎心熱

口瘡咽痛鬱多啼口瘡痛不能食

丹或蜜漬黃柏汁飲之

咽乾泄瀉口爛齒腫心胃熱也

甘露飲或甘桔湯加牛蒡子麥門冬竹葉煎服水漿不入

者紫雪抱龍丸消毒飲如能食便瘡者又當清上溫下不
可純用涼藥多啼當察外証鬱毒在表在裏調之如果

因心熱痰熱者辰砂六一散痘未出葱白煎湯下痘
出盛燈心煎湯下黑龍腦若加龍腦半釐紫草煎湯下貫脹

極忌咳與喘初熱咳嗽氣促風寒在表故也痘出時咳嗽
臨痛吐食不下者半表裏邪也小柴胡湯加

五味子枳殼桔梗小便赤者加山桅赤茯苓如服冷藥太

過咳嗽肢冷嘔吐者其草乾姜湯服貴時呵欠噴嚏却尾

亦忌如咳嗽氣喘乃毒攻肺脹初起尚聲啞而死果係外感

者亦必痘好乃吉○初起煩燥喘急者麻黃湯加桑白皮

及麝一釐或黃芩湯○初起煩燥喘急者麻黃湯加桑白皮

前胡枳殼湯凡無痰喘急不能眠者死○大渴不止恐陰

虛口渴毒火炎上者用甘草瓜蒌根等分水煎服或黑豆

煮豆各二合烏梅二箇水煎澄清服飲水小便少者恐

濕漬脾土後難收腐宜六一散送之內虛津乏者保元湯

加麥門冬五味子或參苓白朮散黃芪六一湯如虛陽偏

盛好飲冷者木香散倍丁香官桂陰寒偏盛好飲熱者異

功散加水香當歸惟血虛痘黑久動發渴者難治凡虛症

見渴者胃緊煩燥安眠少○胃膈緊滿者枳殼湯或二陳湯

皆死○胃緊煩燥安眠少○胃膈緊滿者枳殼湯或二陳湯

皆死○胃緊煩燥安眠少○胃膈緊滿者枳殼湯或二陳湯

報立時燥者表未解也宜清內解肌黃芩芍藥湯和之起
脹時燥者毒欲散未散也宜生黑土旦一末煎湯徐徐冷飲
解毒散熱召復寒或拘攣凡生犀角磨汁單甘草煎湯
俱能解毒實時燥者毒衝心膈也宜利小便大便不通
者宜潤之結加多燥者鮮其餘毒可也痘出及餘毒煩燥
小便不利者用燈心一把驚風二兩煎服煩燥不得眠
者酸棗仁湯
腹痛有塊或堅硬初熱時腹痛甚手足稍冷陰
香正氣散升麻葛根湯參蘇飲俱加山查內傷生冷飲食
腹痛自利者理中湯加陳皮砂仁木香如痘出腹痛便調
者無妨便外身熱痛甚痘出不快體冷甚發厥者獨聖散
或四逆湯服之則毒氣泄而四肢溫腹痛自止已出厥痛
者亦宜
腹脹初起尚可表初熱腹脹毒與邪搏升麻葛根湯
症隨症加減由人但此湯乃於起及結痂後鮮毒未肌之
藥惟內虛胃弱及紅腫見後無表症者忌之如大小便難
者四聖散
此散最飲
失血肺胃被熱侵毒併太腸便秘了極忌動血

口鼻失血肺胃熱甚宜解毒湯加生地大黃輕者黃芩湯
犀角地黃湯或小柴胡湯加生地○痘出下利黃芩膿血
身熱作渴者薤白湯三黃熱艾湯解其毒而痘自出○便
血神昏不醒者抱龍丸救之蓋痘雖內毒運之者血心主
血藏神今便血神昏宜急矣如大小便血及七孔流血
者即死○有因服涼藥以致毒陷瀉血有如豆汁黑者急
用理中湯胃風湯得便即瘡紅活者生若脹貫時便血而
瘡壞無膿者胃爛必死○痘愈後便血或下腸垢身熱者
升麻葛根湯加黃連生地身熱煩渴者解毒湯熱勢盛者
小承氣湯下利者黃連阿膠丸小豉車丸
內外毒蘊便不通煩脹汗渴言譫
活人謂首尾不可下者蓋痘未出有表無裏症既出表盛
裏虛所以首尾忌下奈其間有因外感裏熱及內傷熱食
熱藥以致熱毒蘊結便秘煩燥腹脹手掌心并腋下汗
作渴謔語實熱裏症悉具服四寶壅塞脈絡凝滯壅遏毒
不出不泄不瀉必用下藥通其榮衛而後毒得透發從權
以下利藥中加以升提俾邪熱去而痘毒升痘未出者外

根湯消毒飲加大黃熱甚者亦服散以其有連翹薄荷輕清亦上升發也雖痘出不快有此裏邪實熱者亦宜痘已出或將膿有熱毒便秘者小柴胡湯加生地或四順清茶飲犀角地黃湯俱加大黃尋常熱輕而無煩脹狂譫痘未出者只宜敗毒散連翹散紫草飲紫草木通湯痘已出者四物湯加麥連桃仁麻仁或麻子仁丸以潤之苟非外感邪入裏深極內傷濕熱蘊結與毒相拒斷不敢下惟產後餘毒壅體下之可也故曰痘疹下之早則為陷伏倒靨猶傷寒下之早則結毒也又痘瘡利藥忌用丸丹及巴豆水銀輕粉此三味但能去臟中驚涎積熱非痘家所宜

小使赤澀腹心膨熱微熱甚有分曉
小便赤澀以致心腹膨滿由胃熱心火不降陰氣不能升也痘未出者紫草飲發出其毒即愈痘已出者四聖散加黃芪小便澀赤熱并大便亦秘不敢下者五苓散煎赤散紫草木通湯連翹散以淡之如熱微又不敗澀小便恐損真氣者只宜獨聖散紫草飲以解其毒古云太熱利小便小熱和解是也又曰熱甚狂喘或漿內腐化毒溺多則順稍有膿者宜善調之

發驚誤投驚藥禍非小

痘已出狂叫多怒喘呼者肝熱甚而無陰以斂之也犀角地黄湯

痘毒驚搐雖亦由於心熱肝風旺而脾土虛則火炎為搖宜瀉肝則風自去利小便則熱不炎若藥用驚風涼藥如

銀粉腦脂青金珠砂硝石令心寒而毒氣內伏當出不出已出不歸如先驚後痘者輕先痘後驚者逆痘色粒分明

驚來即去者無害痘未出因外感與內熱相搏發驚者性悍散消毒飲加戒紅綿散大青膏系草膏兼服勻氣散

毒泄而心神自定氣勻而痘瘡自出矣又有暑搐昏者六一散痰盛神昏不醒者抱龍丸或睡中手足常縮將發

驚搐者急用涼赤散利小便或四聖散以解毒○痘已出虛者保元湯加芍藥最妙熱者五福化毒丹瀉毒丸古牛

痘散熱甚搖毒攻心以致黑陷者從權以涼驚丸或我尾膏暫服可也○抑者熱症諸語妄言屬心搖擲驚癇屬肝

腫脹便秘屬脾喘渴咳嗽屬肺遍身作痛毒外行痛乃痘

盡皆四臟所發虛症可以類推之善症或遍身痛或只幾顆痛有外邪所搏者初見紅點時宜參

蘇飲加木香轉者消毒飲或升麻葛根湯倍芍藥甚若更

加蟬退山查羌活有痘出身痛肉斂痘密熱痒清內虛實

表

諸痛爲實諸痒爲虛虛實於形色上分之色不灰陷便

者四君子湯加酒芩連或太黃微潤之通用單蟬退湯時

時服之痒甚者水楊湯浴之或用食鹽和百草霜水濕罨

炒過置次內燒烟薰之其痒立止虛痒亦効或用蜜水調

滑石末塗之且令瘡癩易落無痕○色淡甚則倒靨便瘡

而痒者宜保元湯倍加黃芪實表少加芍藥治血痒

甚遍身凡破膿血淋漓不能坐卧者內托十宣散去桂倍

黃芪加白芷止痒當歸和血木香調氣氣行血運其痒自

止或小活血散合四君子湯加黃芪枳壳有毒氣陷內痒

塌者木香散加丁香玫瑰裏官桂實表

以救之凡手足常搖動者將發痒也虛症腹脹身必涼已

出虛脹有二有因內傷生冷束藥與內熱毒相拒不得發

越故令腹脹宜蘿蔔子紫蘇梗陳皮各一錢乾姜甘草各

五分水煎服食減者加白木甚者發寒肢厥瘡白無血色

多致不救急用木香散溫中逐冷甚則異攻散○有毒氣

陷失作張者宜溫中解毒人適散吐瀉痘出最難當吐瀉

小活血散惟腹脹目閉口鼻者死無妨痘出脾胃冷者胃受散因外感者寒月理中湯五積

散異攻散暑月六和湯胃寒湯因內傷者四君子湯加砂

仁陳散理中湯去參加厚朴宿食重者感應丸○痘出後

極忌泄瀉起脹尤忌有瀉皆屬虛冷急用保元湯加桂枝

或木香散泄瀉若用肉豆蔻一箇乳香一豆大為末米飲

下或固腸丸因泄頂陷者肉托十宣散四聖散加藜蘆如吐

瀉喘渴蛔虫已出日直便流利腸堵者死白汗氣弱難收瀉熱熱薰蒸神木方

痘出後切忌汗多以致氣虛必難作漿收瀉急用保元湯

止之如初起濕熱薰蒸者用白朮二錢黃連一錢浮小麥

煎服若傷風自汗量用桂枝防風痘出寒熱內虛甚寒戰

可也惟身寒汗綴如珠神昏者死

火辯必發弄已出痘而寒熱者屬內虛五日前後獨寒者

氣血與毒俱盛之過七日前後獨寒者氣血

損而毒火內鬱難治寒戰咬牙足膝冷如冰身反熱

張貴驕時極忌乃氣血虛極宜保元湯加桂甚者異攻散

變症冷秘熱吐瀉

臟腑熱則便秘脾胃冷則吐瀉常也有嘔吐不食面青瘦者為冷秘久不大便

而無裏急後重者為虛秘俱宜內托十宣散氣虛者四物湯麻子仁丸又有能食結滯下如栗塊者為風秘胃脇腰

腹引痛者為氣秘○熱毒攻胃吐瀉手掌心并腋下熱而戰戰有牙臉赤渴欲飲乳乳滿胃膈不化則吐吐了又渴

急欲飲乳是熱吐也小便赤澀而渴者熱瀉也俱宜五苓散竹葉石膏湯加陳皮痰壅吐食者二陳湯濕熱吐者葛

根竹茹湯加黃連濕熱瀉下臭穢者解毒湯加白朮○太

吐身熱腹滿二便赤澀面赤喘悶者當利小便四苓散導赤散不瘥者

宜風散下之熱甚四肢仍發厥凡痘症身寒不治但其間有患熱症而忽發厥肢冷

者猶傷寒伏熱深而厥亦深也宜隨症用清內解太便不

通小便血遍身肌肉盡破裂初熱誤用熱藥報痘又以胡

實者令毒攻臟腑肢絡灌注耳目口鼻咽喉閉塞大便不通小便如血或為癰瘡肌膚破裂皆陽盛無陰也宜猪尾

膏犀角地黃湯解毒湯三黃丸服後瘡出紅活者吉倒靨者死○暑月痘爛生蛆乃熱毒盛也內服清熱之藥外以

帶葉柳枝鋪地卧之或水楊湯沃之亦好痘變倒靨與陷伏痘色初出淡紅變

出鮮紅變紫紫變黑者逆○痘形陷伏倒靨自其內傷氣

虛而不能起發而言謂之陷伏宜溫中托裏令脾胃煖而

榮衛通也甚至疏附亦可暫服自其外感及穢汚而言謂

之倒靨外感宜溫散寒邪而榮衛復行犯穢宜薰解之凡

當出不出當脹不脹當貫不貫當靨不靨俱

以照原為氣血旺退減均謂之倒靨陷伏

詳究黑乃北方寒水之色然火熱反兼水化色亦能黑故

變黑當察寒熱寒症變黑者因風寒歸腎宜溫散因

內虛毒陷宜溫補熱症有毒盛火炎宜涼心清解有臟燥

無陰宜潤血化痰噫痘變不過陷伏倒靨黑陷斑爛四者

黑陷最危初出黑色狀如蚊秘燥皆因瘀血蓄

可不究諸初出狀如蚊秘燥皆因瘀血蓄

者因毒氣暴出瘀熱搏之故血凝不行遂成黑陷大小便

閉腹脹喘急煩燥宜山施仁湯八齒散加味四聖散單蚬

退湯加紫草出不快
者宜毒膏猪尾膏
出不能快如炭焦表分太熱還宜透

表熱如炭焦黑陷伏見熱症者透肌散加紅花地骨皮或
單犀角磨冰服之或獨聖散小活血散腹痛者單蟬退湯

乾枯倒陷甚者單麻黃五錢用蜜水拌
燉水煎去沫再煎乘熱服之其痘復起青乾紫黑身熱微

便秘急下去陳垢
痘出不快已出者青乾紫黑身不大熱
大小便閉是熱滯於內毒氣無由發泄

宜宣風散氣怯者木香檳榔丸俱令先下黑黃次下濁糞
後以四君子湯加厚朴木香陳米和胃良久糞黃瘡自出

透若表大熱者不可大下如青乾紫黑身
牙出不止煩燥熱渴腹脹喘喘二便秘者危入裏熱極身

紫黃毒瀉膿痂惡毒臭
毒氣入裏心神昏悶或出不快或
難結痂乃毒火燥盛以致黑陷者

猪尾膏涼心通竅則氣和神疎而痂自結矣○痘出黑陷
及潰結痂不結痂便秘腹脹身黃紫腫變黑濕熱最重者

急以單大戟丸利去膀胱邪水猶傷寒木賊土敗急下之
可保五死一生如所下水穀不消身冷戰振多汗兒耳熱

者為水溢土崩必死若下後身熱氣溫飲水反身冷或溲膿血瘡痂者為毒氣盡去胃氣猶強溲後仍宜四君子湯

加厚朴木香溫脾為妙臟燥至極已亡陰痰盛發驚狂叫吼毒鬱臟

以守狂叫喘呼痰盛欲發驚風者四齒散加蟬退古牛黃散以解毒遂成黑陷者犀角用地黃湯以養陰抱龍丸以降

痰若發驚狂謔語者辰砂六一散用紫草燈心煎湯磨犀角玢瑁汁調服或護心散蓋涼血則不致紅紫鮮毒則免

黑陷失治不果係虛寒二便清脾腎兼補加訶蕊痘出裏白聲啞而死

惡熱以致黑陷者八物湯去地黃恐滯血夫為藥恐伐胃加木香和脾胃大補氣血蓋脾胃暢而不致內陷氣血盛

而不致瘵塌○寒冷多因乳虫忍饑受冷以致芽兒寒冷歸腎痘變黑陷寒月木香散異攻散發之天溫時內托十

宣散去桂木香帶紫為熱帶白虛黑如烏羽猶可救帶紫加紫草蟬退

血熱四物湯加芩連紅花帶白者為氣虛保元湯去甘草加紫草通用靈砂三五粒磨酒服能起黑陷凡痘變黑如

烏羽光潤不發寒而尻耳冷者爲外黑裏白赤者輕外黑
血活可救紫草飲合小活而散裏白者輕外黑裏赤者微重外白裏黑者
太重瘡頂陷黑中有眼如針孔紫黑者死輕甚一箇大黑
痘頭面上忽生三五箇或只一箇高大紫黑儼似釘痘者
痘名曰飛痘有此痘出最輕或只此一痘再不出痘是知
黑豆生死輕重迥殊可不詳辨深究之乎通身斑爛膿不乾
痘當發散不發散則毒氣閉塞曾滿喘促悶亂不當發散而強發散則
痘毒出盛表虛難靨以致肌肉如爛故曰瑛爛治宜調脾進食令大便不
秘不利養榮衛以生肌解毒則無自赤咽痛口瘡吐衄等症如大
便不通膿水不乾者牛黃丹瑛爛膿汁不乾作痛者敗草
散或乾黃土爲末乾糝輕者用豬膽汁調芒硝未敷之勿
令動着直候瘡痂自落瘡爛成片欲不成癰痕者用乾牛
糞火煨過取白心入乳香爲末藉之甚者麥蘖襯臥暑月
熱盛當藉之以芭蕉葉○有因過汗內虛臟腑自利瑛爛
或因飲水多者俱保元湯加防風白芷外敷敗草散○敗
草散用蓋屋及牆背上遠年腐草洗淨焙或晒乾爲末帛

裹撲之甚若鋪床席令兒卧之甚妙此草經霜露及義解瘡毒作痛有如刀刻鏤穢汚觸

治見要知痘變頂不變陽存生意必然復報痘自頂上陽位起且稠者固

肉如痘遍身變壞獨頂額上不變則吉貫膿時變成水疱

無膿皮薄如紙遍身擦之即破惟額上不破者可治若陽

位與心胃先破者死速收膿時敗症急見惟額上太陽方廣頂上未膿如舊者可生疔痘頭面背

危四肢點破毒可泄起脹時有痘長大而紫黑者名曰疔痘疔者釘也把住痘瘡不起蓋氣血

弱以致毒聚而成形如氣血勝而毒變制結於四肢或

或箇數少而穿筋骨者易治結於頭面腹背逼近於內者

勢必穿臟腑難治急以保元湯加牛蒡子荆芥芥連助氣

逐毒外以銀精挑破疔頭令父母以去惡血或綿裹指甲

摘去惡血展去亦可蓋痘破而毒氣得發故也或用珍珠

五粒鉄器上灸黃色斑豆四十九粒頭髮一團俱燒存性

爲末油臘脂調成膏將兒在溫懷處忌風寒穢氣先用銀

簪挑開疔口將藥點入疔內即時變爲紅白色餘瘡皆此

又有黑痘獨大頂心黑撥之如綿筋有臭者保痘癰手足元湯加芎桂糯米補提其氣如變黃色者可保

先腫疼血引毒注三陰穴凡痘癰必先手足及脉絡之處或有紅腫或手腕鮮紅一塊或

手足有硬痛處或足痛不止或足上痘腫如瓜皆發癰之兆也因其腫痛深淺而知其癰之大小原因痘出復被風

寒鬱其熱毒或痘出服熱藥熱食過多所致又有痘變壞而毒併一處發者反治法見後痘症蓋痘未愈時雖癰

發亦不宜治癰初起留前腦上有一塊紅腫及遍身有塊者死貫膿時足腫青紅流涎痘不好者亦死脹貫

收膿或不齊發疔發癰反可悅凡痘當脹貫不脹貫當膿

凡癰毒疔痘生於胃前腰腎之間至重紅小者生黑大者死

陽毒凡瘡每乘虛濕潤為

實乾枯之七日前陽毒凡瘡即黃疱血風露花楊梅瘡之類痘瘡未痊及初結癰處肉分必虛毒趨重處

而出陽瘡陰毒稠雜一黨反勝諸毒而名之也其瘡濕潤者為氣血俱盛而諸毒易成漿也宜解毒湯主之其瘡枯

者為氣血俱盛而諸毒易成漿也宜解毒湯主之其瘡枯

燥乾紅者為氣血俱弱毒與諸瘡相拒而俱不成漿也宜保元湯加苦桂糯米更以水湯湯沃之則枯轉潤白變紅其漿自溢矣○水湯湯楊柳五斤春冬用枝秋夏用葉洗淨搗碎取長流水一大釜煎六七沸去渣將三分之一注盆中宜先服湯藥然後乘熱洗浴又許乃以油紙點燈照之曩醫家然有是勢陷處有圓暈紅絲此漿影也漿必痛足如不痛又如前浴法弱者只浴頭面手足勿浴背燈照如無是勢則氣血敗而津液枯蓋痘不成漿乃氣泄血滯腰理固密藥氣力緩頗難頓爾達其頭面手足惟服藥後以此沃之其藥藉此并提開豁萬竅洗法必添湯又浴使其緩透肌肉疏通內外斯毒氣隨暖氣而發凡報痘起脹行漿貫滿痘瘡頂陷漿滯不行或為風寒久尅者皆効

壞症頭低肢軟脆

初起表症足冷無害惟足冷頭低四肢軟弱始終大忌痘出後頭溫足冷者亦

死面色青腫枕鼻屎

痘以心血為主面赤者順面青必生風虛下利厥逆○報痘誤服熱藥發

而不透以致身體頭面兩自皆腫風搖身強者人多差若散救之如當脹之時頭額腫如瓜或面腫或頤頤亦

癰疽腫者死宜消腫毒補中氣以救之若瘡色與皮一般腫根紫紅者無害或一邊面腫形色順者吉○鼻燥有黑氣或以手拭露睛耳焦唇紫兩目閉而露睛無魂如魚而光燥者亦死○耳內焦黃唇紫燥烈甚則唇崩潰爛乃見標之時復感風寒使熱毒攻內不治口爛舌

卷憂牙齒口內臭爛舌上白胎或黑舌卷囊縮身必戰動

因七日前後風寒所中膝理周密寒其毒反攻臟腑之內其量與清胃消毒散解散風寒之劑救之○咬牙作渴身熱者心胃熱也宜甘寒飲如寒戰咬牙則為腎毒上攻內托宜散去防風白芷加茯苓救之聲啞飲

食便秘喉聲出肺與心或感風寒失聲或飲食毒壅或多

湯便秘者并枯湯加當歸黃連大黃身涼者內托十宣散倍桔梗如漿滿聲啞者肺氣絕也不治痘出不好聲啞者亦死又有飽逆胃寒冷氣上升也宜鹽炒吳萸一錢丁香五分水煎服○咽喉有毒飲食如鋸挫喉水漿不入或吐

出或常乾嘔者危若胃腹腰痛如咬囊縮死能起立胃高

時見此症二便閉者反吉足冷者腎絕若微痛者風寒所傷敗毒散解之外以麻油揉按○囊縮者肝絕不治身溫為實身涼

虛溫補解毒法盡矣不問初症雜症變症壞症俱以身溫為順身涼為逆譬之種豆晴暖則易

生且人無非常之熱亦無非常之冷惟身溫溫則為氣血和也大緊熱症身溫俱宜解毒虛症身涼俱宜溫補虛症

有熱者溫補中兼解毒熱症有虛者解毒中兼溫補○解毒初出消毒飲連翹或解毒中畧兼溫補解毒防風湯鼠

粒湯○溫補血虛四物湯或古芳歸湯氣虛四君子湯或保元湯為主泄若暫加白朮茯苓煩渴加門冬五味子虛

熱加黃連濕痰加陳皮氣鬱不通加山查消毒加鼠粘子退離腫加荊芥穗扶胃氣加陳黃米助陽發表加生薑色

紫血熱加連翹要知連翹鼠粘山查甘草始終必用官桂川芎紫草為藥五七日後慎用氣血俱虛者內托十宣散

耗裏散或保元湯加當歸芍藥以活血或合芍氣散以和氣溫補中畧兼解毒又物湯加酒炒荊連或保元湯各一

氣溫補中畧兼解毒又物湯加酒炒荊連或保元湯各一

氣溫補中畧兼解毒又物湯加酒炒荊連或保元湯各一

錢加牛夢子黃芩黃連玄參系灰連翹白芍各五分姜
葱煎服七日後勢重毒深者氣虛保元湯加大黃血虛古
芎歸湯加大黃芒硝下之又有虛寒變症水香散異攻散
古姜附湯四逆湯皆救危妙劑但虛寒常遲十數日方死
熱毒者死速已止
總論初熱以至冰厥

初熱微似太陽病所異顯赤中指冷

初起發熱惡寒類傷寒太陽表症但傷寒

男面黃女面赤麻痘則顯赤也傷寒中指熱驚風男左女
右五指俱冷麻痘中指與耳鼻尖及手足俱冷又察其耳
後有紅筋赤絡為真無筋者非痘
筋紅赤易愈紫者難治黑者死
太陽正病不須醫感傷

傳變用藥整

初熱見太陽表症乃痘家正病不必服藥惟
內傷外感挾痰挾驚及四臟見症熱輕者勻

氣令其自出熱重者清肌解毒甚則透泄但誤下則傷脾
誤溫則損目慎之
外感表證熱盛痘難出難作漿宜表
托以助其欲發之勢兼心症者惺惺散消毒散兼肝症者
人參羌活散兼脾症虛者惺惺散或保元湯加地皮黃芩

荆芥熱者升麻葛根湯如聖湯兼肺症者參蘇飲加葱白
山查根通用無汗者羌活中和湯有汗者防風中和湯邪
傳半表半裏見胃脘嘔吐煩燥不眠等症小柴胡加生地
虛者二參湯邪傳入裏二便俱秘或溺中見血者承氣散
防風通聖散下之有不效下者蜜導法輕者四聖散合敗
毒散或合辰砂六一散或解毒湯微微滲利不可盡去其
熱痘難發○內傷飲食生冷見嘔瀉者寒月理中湯胃
受散不換金正氣散暑月六和湯二陳湯胃苓湯如傷食
食俱加山查麥芽消導之藥○挾驚者如戒紅綿散○挾
痰見血者犀角地黃湯合小柴胡湯○抑論痘症始終必
兼四臟如熱衝於心時作驚悸甚則狂譫宜硃砂參苓之
類熱蒸於肝呵欠煩悶甚則發搐宜防風羌活不麻全蝎
南星之類熱蒸於脾作涼作熱肢冷多睡甚則目腫腹脹
便秘作渴宜枳壳陳皮神曲山梔地黃之類熱蒸於肺面
赤噴嚏甚則喘渴咳嗽鼻乾宜桑白皮半夏馬兜鈴之類
惟腎無症所以兄耳宜冷若先如瘡後發渴其瘡色黯乃
腎症不治然四臟又以脾肺為主蓋肺主皮毛脾主肌肉故也初熱為根痘為標根少標

多生不永

痘未出非太熱不能發痘已出非微熱不能成

一二日即湧出鮮紅根少標多者七日後

死若全不發熱痘少而好又無難症者輕

欲防眼患藥宜

清痘出太盛恐入眼為患宜消毒飲或氣血藥中加酒炒

藥其自自然深護眼砂亦簡省

治反至損目

兩莖豆粉一兩半甘草四

此為末痘瘡正發之時用清油調塗兩眼四畔則面上痘

亦稀少或用硃砂為末水調塗眼眶或只用乾胭脂末蜜

調塗眼眶則痘不入眼

少許每五分作二次量兒大小加減溫水送下不拘痘瘡

出未首尾可服密者可稀稀者可無黑陷者可起痘癰

掀腫可消兼治壯熱煩渴微喘但性亦微寒不可多服

報痘三朝毒居中忌汗忌下和為上

報痘毒居半表半裏寒藥傷胃滯毒熱藥

愈助火邪忌汗者痘點在肌無俟於汗也忌下者痘在肌

而反空腸胃無是理也縱有外邪亦但於宜服藥中加以

陳皮生髮之熱未微者猶有邪半清表方半溫養熱微出痘為安

如熱猶未微者必感傷邪未盡淨此時熱毒內薰恐後帶為癰毒宜半清表半溫裏之劑調之四聖散解毒防風湯

紫草木香湯加報痘乾燥腹痛腰痛不止者死

一日母痘初見形幾點淡紅間架明痘先出者為母後出者為子孫母好子孫

多則自然有不如者亦無害如紅點先見於口鼻上下顙額年毒之間眼中全無大小形狀不一作三四次出或準

或雙間架明白稠密乾紅宜漸補三五相連圓壘成箇乾淡紅色潤者順紅少潤者逆施補藥

俟其氣血交合方可保元但嫌枯黑參天庭先見於天庭方廣印堂兩

耳太陽太陰及結咽心胃之處或頭尚無而脚先有或心胃稠多腰密纏過如蠶種者急用消毒飲加山查黃芩紫

草虛加入參或升麻葛根湯加連翹二分或敗毒散犀角地黃湯以清內能肌如初發便見腰痛瘡稠乾枯幾點此

黑者死或問紫黑歸腎陽位不宜何也諸陽聚頂諸毒聚
頂頂稠枯黑毒勝氣血明矣嘗考瘡毒一發出於四臟而
腎不獨邪為毒如申酉戌時發熱屬肺發為膿疱如淨色
白而大巳午未時發熱屬心發為血疱色赤而小多兼癰
亥子丑時發熱屬脾色黃微赤多兼疹寅卯辰時發熱屬
肝發為水疱如淚色微青而小此皆初發之狀不同如此
告報這三日當悉成血疱起脹二日後血疱成膿疱貫膿
三日後膿疱結痂而瘡愈矣蓋貫膿膿瘡色黃充滿與初
出色白淡淡如膿者名同實不同也

二白如粟根圓混頂滿光明碍指佳

二日紅點如粟如黍如菽豆如真珠如水

晶頂滿色光根脚圓暈混合不散以手摸之覺得碍指者
順如根窠雖圓而頂陷者氣弱不能通血也保元湯加芎
桂助陽但川芎暫用以為參芪之使有汗者忌之
若頂陷色枯或鮮紅連肉亦紅又無根脚者必死
多毒太盛出速且密胃胃充多身熱者恐毒盛不能收成
必變青乾紫陷宜消毒飲單粘湯解毒防風湯

以防之。出盛面黃便黑煩燥腹脹或見血者犀角地黄湯。出盛內外熱壅血聚以致不能食腹脹便秘煩渴喘急狂譫者毒氣與心貫注無陰以救也宜猪尾膏毒盛壅遏出不快者亦宜若出不快而更甚外邪入裏遂至胃爛便血而**出遲內虛必挾邪**紅點數日不出而復隱者逆惟出死。若既用發散陽氣外出令蒼色白縱出亦有忽然而斃者矣。有榮衛虛不能出者必面青肌軟惡寒宜小活中散入物湯中氣下陷而不記發者保元湯補中益氣湯。齒散有脾胃冷因服涼藥損傷以致吐利者須益氣溫中。中溫則氣不消削而自充發於肌膚矣宜益黃散理中湯九才香散甚者古姜附湯或大斷下丸。去姜附檳榔加砂仁木香。痘出而復不出或泄或秘煩渴者乃痘出誤服涼藥逼毒在肺中痘帶白膿者輕紫黑者重鼻有黑氣者死。外盛裏虛毒氣發越不透半成血痼半是紅點不能乳食大便如常小便清白宜半溫熏半助表四聖散紫草飲解毒防風湯萬金散紫草木香湯蟾肝丸或絲瓜連皮燒灰沸湯調服或葡萄研酒飲之選用。有氣貫痰癰

滯發不出者二陳湯踈氣飲○啼叫不已神不安舍不能
主行榮衛而發不出者勻氣散小活血散大溫驚丸○外
感羈絆胃氣而出不快者便清自調知其表方可量體
微微發散因天寒不能出者熟料五積散正氣散或參蘇
飲與葶藶膏四股出不快者防風芍藥甘草等分水煎服瘧
瘡不出傷寒不語者單燒人屎爲末蜜調服瘡毒既發瘡
瘡不發者黑膏○因炎暑煩渴昏胃不能發出者辰砂五
苓散用生地麥門冬煎湯下身熱甚者小柴胡湯加生地
煩渴便實者白虎加參湯輕者竹葉石膏湯加生地○外
感邪入裏不舒大小便秘氣滯壅遏而出不快者紫草木
通湯瘡發出者紫草飲如瘡出乾黑身不大熱大小便秘
者毒滯於內也宜宣風散用大黃煎湯下若表大熱者不
可妄下或已出稠密喘渴者當歸
九黑膏輕者消毒散加木黃山梔已出復被風寒拒青紫
如瘡遍身遮瘡出被風復入者加味四聖散或快藥散太
相拒不能發出以致發熱狂搖遍身或青或紫如瘡點如
應疹俗云鬼捻青年壯皮厚者多有之宜卻寒溫肌透裏

之劑危甚者用紅霜紫背荷葉舊者亦好入姜蠶等分爲末胡荽煎酒調服或絲瓜連皮燒灰爲末沸湯調服發痘最妙見風寒表症者用溫散散古出不少過色不潤痘已出牛蠶散見熱毒症多者透肌散過色不紅潤者乃毒盛以致氣血壅塞故也宜紫草飲外用芥子爲末白湯調如膏塗兒脚心乾即再塗其毒漸漸復出痘瘡但要照原不減些凡痘出不快而先出之痘形依舊紅活但要照原不減些色照原者乃毒未發也如形色漸退者乃內虛毒入必死若宜出喜笑如常飲食進精神爽無諸雜症則痘本少也不可再發壯年皮厚多勞役舊以飲乳嬰兒臟腑嬌嫩服藥但宜釀乳與能食童子可以服藥治有不同然年壯與年幼者又有不同若年壯外實皮厚毒難出或快出或被風寒相搏則身痛甚宜透肌散主之或勞役汗多氣弱發熱耳目皆昏脉大者當用補中益氣湯去升柴自始至終服之有虛無寒不可用丁香姜附反致熱耗元氣又有以子破陽已多女子通經已後乃患痘者尤宜謹慎常服保元湯以固脾胃八物湯調理氣血腎虛者腎氣丸以滋水使腎氣

旺而毒不下陷也孕婦動胎生摘瓜孕婦以命門繫胎痘毒入發

安胎飲加黃芩白朮為主天寒有表症者間用五積散去

麻黃半夏厚朴姜桂換白朮赤茯苓赤芍加柴胡黃芩阿

膠人參糯米等分水煎服身熱咳嗽者暫用參蘇飲煩燥

者古芍朮湯加白芍麥門冬或小活血散痘細密者肩粘

湯痘出太盛或便秘者犀角地黄湯紫草飲痘出不快者

消毒飲痘出後血虛者古芍歸湯加芍藥氣虛者保元湯

加芍藥氣血俱虛者內托十宣散去桂倍歸芍加烏梅香

附熱盛恐墮胎者胃胎散胎動者安胎飲連進或單砂仁

炒為末酒調服服後覺胎熱則安凡胎前患痘倘用峻藥

動胎去血泄氣者孕婦必死如生摘瓜必動其蒂也患麻

亦與痘同若無孕婦人麻痘初熱煎熬血海必然經來小

柴胡湯加生地主之產後麻痘但忌芍藥以黃芪代之

三日出齊至脛股三日放標至足三陰為出齊正宜觀形

頂起而色慘不明者保元湯加官桂助陽芍藥

飲陰糯米溫中若一日出齊乾紅紫痘者死上脹下無

亦可取

上先有起脹而下身還未出或出未盡者無妨

淡白頂軟氣全虛

淡白頂不

堅實不碍指者氣虛也內托十宣散去防風白芷自汗倍黃芪聲不出倍桔梗

白光帶紅決不愈

痘白色薄根全無紅色或根帶一點紅三五日後如菜豆樣者決不能貫膿而死

淡紅摸過又轉

白血衰氣滯宜大補

根窠不紅或夏紅手摸過即轉白者氣血虛也十全大補湯或但淡紅不

轉白者血虛

口角有粒如疥形將來變黑歸腎腑

口角此時有粒

也小活血散

如疥不日必變焦黑歸腎而死

鼻有餘瘡妨睡息

痘出後有餘瘡塞鼻中不得卧者用水筆花

末入麝少許葱白蘸

紫泡刺黑無生路

痘稠密中有紫泡刺開血紅乃血熱

熱毒化瘰湯救之血黑者死又有白泡者乃氣協熱毒仍以化瘰湯解之

起脹毒盡浮於表最怕中虛入裏了

痘出三日後當朝起脹先報者先起

後帶者後起至五六日毒盡發於表宜內托不致內攻
痘氣血壯弱變毒深淺全在此關諸虛症見而痘形色反
者皆死雖然氣血有盈虧平陷仍分痘多少
氣盈血虧則頂平而色光潤
痘多者亦自無害血盈氣虧則頂平而色又乾
枯恐變陷伏不論痘多少俱內托十宣散救之

四日血痘已分明四日水痘當成血痘淡紅不喜胃背顙

尚平額上紅者終不起脹顙臉一身之主若顙上先脹者

等處皆脹准胃背不起脹則不宜上脹下緩固無害
上體已脹下體緩慢

慢者逆陸續出者反長坐有出不快直待起脹時陸續出
如粟米於痘空際圓淨者亦吉

五日頂尖欲碍指五日頂尖滿起如鼓丁額項皮紅擦破

死痘起滿頂紅紫連皮肉紅賊痘軟大氣血衰報痘雖稀
或遠項紅後必擦破而死
根窠全白

無血三四日便起脹痘大按之虛軟者此名賊痘氣血大衰也保元湯加紫草救之額上見之尤凶必貫膿時變成水疱擦破而死毒陷腹上多青紫色外症口角流涎者必死

六日圓滿光明美

六日氣血榮盛發揚於外原形尖圓肥滿紅活者順

血熱紫紅尚

不起火盛血熱色紅紫不起脹者內托十宣散去桂

中陷

黑白皆氣虛

有中黑陷而外白起或外黑赤而內白陷者氣虛而血熱也宜免血丸如原不起頂灰白

陷者氣虛也宜單人參湯或保元湯加川芎助陽當歸和血木香行滯如頂陷漿滯不行或風寒久尅者水楊湯沃

之惟腹脹不食神昏者死

水疱變痒一定死

頂陷灰白紫黑必變為水疱發痒而死

貫膿

三朝胃氣升自肌從漸至充盈

痘以胃氣為本胃氣升騰化毒成膿自肌

肉上貫起漸至頂切忌寒涼與疎泄傷脾損胃漿難成

九竅俱宜封閉極已寒涼解毒及疎發淡滲之劑傷脾損胃清氣下陷不能實腹或吐利不止或二便下血聲啞腹脹乳食不化寒戰咬牙痘爛無腰肌肉黑者不治

七日漿行痘裏黃淡紅軟大非真漿漿行痘裏肥滿黃光

者吉色淡者虛血虛四物湯去地黃加紅花少許氣虛保元湯加桂米若淡紅疎大如膿者必變焦黑其間紫者血

熱灰白氣虛如前法治水痘皮薄有根活純是清水皮白而薄與水

或根窠起脹血紅而活猶有生意者內托十宣散倍其當歸又將人乳汁和酒各半溫服又有痘中生水疱乃氣盛

津液有餘隨毫孔生出小如圓眼核者皮破流膿去濕方保元湯加山查白朮大如鷄卵者死

有濕痘內如水漬皮未破者宜溫中藥內加防風白芷以瀉肌表間濕氣如皮破流膿不乾者用白螺壳火煨為末

乾糝或用苦參滑石蚌粉輕粉白芷等分為末乾糝瘡口餘詳前藥爛條中空乾燥血枯朽火

盛天水義悠長

中空乾燥全無膿水血分枯朽剥極宜小
活血散加當歸火盛者一散加荊芥乾

葛升麻輕清之劑以散其
火服後猶無膿水者死

八日漿成喜飽滿不滿只是氣血緩

八日氣血大振毒漿
已滿將欲收斂之時

圓滿光潤者吉其有化漿不滿者乃氣血因

寒少緩也宜保元湯加姜桂糯米助其成漿

不齊參黃芪水酒各半煎服人弱不食者入人乳○痘皆

貫膿中間幾顆不貫者終變虛寒痒塌宜
內托十宣散或托裏溫中湯倍加補藥

不齊有熱亦難

貫當結膿窠不結此由毒氣內外灌注血熱相搏必復入
貫心急宜猪尾膏涼心血使陰氣感之隨時結痂回漿日

面至頤或至脅不
回膿而住者死

九日回漿新自額

頭面上先回漿四肢方絕起脹者吉
七日前唇上有痘幾顆膿黃熟乃毒由

攻胃爛 背先肚上無漿涎 肚上未收背先收者必身敗必死

也摸過皮皺難收 凡貫膿肥痛度易結膿雖脹滿光澤可觀然摸過軟而皮皺縱橫如橙子

皮者中雖有膿不甚 膿清收者亦徒然 膿清或半膿半水滿足必不能收 若必變瘡塌而死

若四肢脉絡處 發難毒者可生

收膿三日如果熟 如果熟蒂落氣收血平光色如 欬黃黑色光者輕黃灰者重 虛寒有

膿難結壳 有膿紅者輕無膿白 收成大半熱宜清半或見 作膿在掌症乃氣血不能收欬疽口眼流膿防齒目

清膿其內免毒遺於臟腑以生餘症 流涎帶血者必患牙疳齒落眼角出膿太甚者必損雙目

俱宜清解內毒以預防之 有漿回眼腫不能開者以水潤

眼帛帕拭去膿屎思用指攀開 膿皮透一點風不致有翳攻睛

十日 瘰癧似葡萄按之堅硬不灰焦

十日收膿膿滿回

紅葡萄酒色者佳自上而下按之堅硬全瘰癧快有瘰癧可保

無灰陷焦黑者生自下而上倒瘰癧者死瘰癧慢有黑反可調當瘰癧不瘰癧謂之

瘰癧亦忌快快而發癰瘰癧者生快而失聲者死瘰癧慢有黑反可調慢凡瘰癧不瘰癧

氣急瘰癧上聲瘰癧目閉無神者死間有黑慢亦有熱觸瘰癧者

者反吉保元湯加苓木助其收斂結瘰癧無陰以斂生微潮有內外熱極毒氣散漫而無瘰癧氣以斂

無水瘰癧即結瘰癧矣但七日前最忌砂糖○有觸瘰癧月寒黑

瘰癧不收瘰癧者異文散調四尿散最妙○有毒盛不結瘰癧者

猪尾膏換瘰癧不能瘰癧因飲過原因初出之時煩渴引飲

一散以解其標君不因飲將瘰癧全白瀉難熬色如豆壳者

水者保元湯加苓木主之將瘰癧全白瀉難熬色如豆壳者

仍因初時飲水過多故瘰癧不能瘰癧亦曰倒瘰癧大便必則通

大使小便使則通小便使連翹散小柴胡湯加枳壳四順清

京飲如泄 傷冷瘡陷傷熱爛 凡瘡瘡解毒已清至取腐肉

搗不屬者異攻散如寒戰咬牙手足顫掉及腹脹足冷過

勝者危亦宜此救之○凡痘過服寒熱表藥以致痘爛不

結痂者小柴胡湯倍乳膏麥門冬煎湯下外用敗草散敷

之有臭爛深坑不收口者用猪膽汁調芒硝末敷如遍身

臭爛如餅搭不可 陰囊腫起命三朝 先屬起者死

十一日 漿老痂已結 忌用峻寒峻熱恐致內損之患 脚

根紫者還是熱 將成熟之際脚根色紅紫者屬熱用涼藥

炒麥連連翹之類蓋 氣衰頂陷漿濕乾 奴屬注尿尖圓結

犀角升麻善解熱毒 更漿熱盈不斂者危保元湯加苓朮以救之如痂

結剝乾不潤內無血者亦危八物湯加黃芪救之 遍身

屬盡留一節 雖一節被傷不能退者亦死若原貫腫大者

毒氣盡出不生

異症者無妨

十二日 痂落從頭如足節節縱然臍下若妙痂未易落色

宜耀 痂難脫外見熱症瘡色紅紫因原貫腰不痛身臭

敗身上痂不落者加地骨皮頭面痂不落者加白芷外剪

去頭髮以烏柏油搽之若見諸虛症及有潮熱者必危

腐痂迭凸紅色佳若無血色還堪吊 腐後痂紅者吉白無

者用韶粉一兩輕粉一字研勻猪油調塗痂上 痂落不

宜早見風好事痂痕需藥療 痂剝之後見風太早以致成

或炒白堊藥為末鷄子清調敷或馬齒莧絞汁熬膏塗之

或用人精調鷹屎白敷之其痕自滅如欲不作痂痕者雖

於絕結痂後即以真酥潤之用手抓破或剥去又潤之稍

遲則乾硬深入肌肉經及方脫遂成痂痕○凡痂後肌肉

尚嫩不可洗浴亦不宜食炙博五辛五味并有毒之物
恐執毒薰於肝腸眼目多生翳障必過百日乃可萬全

瘡症無非是餘毒毒盛痘再發如初
痘疹愈而再發者亦輕因愈後失於解利

毒氣未盡治宜保元湯加解毒藥其體增減
餘毒仍當分虛實虛症坐立仗入

扶
這後雖症熱多虛少但亦有稟弱及服涼藥以致愈後坐立振搖須入扶策宜雙和散保元湯吐瀉熱

渴補脾胃
中氣暴虛不食者參苓白朮散胃受散虛熱口渴不食者四君子湯加陳皮山查黃連吐瀉理

中湯九益黃散異攻散久不止者危身熱自汗者補中益氣湯壯熱經日者一參湯
飲食調和漸自

如
輕者但以飲食調和久則氣血自復純陽之體痘毒之餘慎不可服峻藥
實症能食何須藥

能食便秘當預圖
痘愈能食便秘者脾胃實無害惟胃中壅熱善消穀食太便秘硬將來必口齒咽

痰吐衄驚風之症或發為瘡痘癰毒宜量體清解如魚服熱藥過多者必用三黃九利之便秘口渴身熱者太黃散

胃熱嘔吐口舌生瘡下部亦有瘡而下利膿血單黃連湯
煩渴溺少者五苓散作煩渴者單黃連湯或燈心一把繫
甲二兩水煎服溫壯齒疼或腫者其露飲口牙出血者五
福化毒丹咽痛者抱龍丸或甘桔湯加牛蒡子麥門冬竹
葉肝熱多怒時不得眠者柴胡清肝湯下血疼痛者薤白
湯三黃熟艾湯心痛不可忍者用乳香二錢或加沒藥當
歸赤芍水煎服身熱不退
若小柴胡湯竹葉石膏湯
手足厥冷口噤涎流聲如拽鋸甚則手足微搐此因裏虛
被地風所吹名曰中風宜消風散二錢入蟬退末一錢分
三服入生薑薄荷汁及酒少許溫湯浸之連進二三服當
隨時少進或作癰疹或作瘡疹而愈或小續命湯去桂附
加荆芥
亦可發搐咳血更難除
愈後非時發搐目瞤面赤飲食
散抱龍丸或小柴胡湯加生地又有病後胃弱食積發搐
潮熱大使酸臭不調或嘔吐腹疼宜紫霜丸小承氣湯選
用疰惡者死○咳嗽有觸肩風寒者參蘇飲如喘
滿者前胡枳壳湯若毒攻肺喘急咳臭膿血者死
入眼

翳膜皆忌點愈後目翳但宜活血解毒則五臟和而夜痛自止翳膜自去則不致凹凸損陷不宜點者
毒氣自臟達外點藥攻逼反以為害但翳膜已成者只用
生鱈魚刺五點入翳上更服兔屎湯最妙若無翳但眼目
無光者過百日後氣血復自明但曾過服熱藥熱食風毒
盛者須內服藥清解或曾過服利藥及竹葉散弱以致症
愈眼昏不明仍當量補肝腎脾胃○熱眼丹後方山施決
明赤方當歸黃連防風連翹升麻桔梗作小劑煎服治症
瘡傷眼○熱翳地黃散生地熱地當歸各一分防風羌活
犀角蟬退木賊穀精草白蒺藜太黃各一錢玄參五分木
通甘草各一錢半一方有黃連為末每五分量兒大小用
羊肝煮汁調服忌口將息治症瘡入眼心肝壅熱目赤腫
痛或生赤脈或白膜遮睛四邊散漫者易治若暴發黑睛
多致失明宜速用此大人亦宜○風腫翳膜者蟬壳散蟬
退地骨皮牡丹皮黃連白木菊花蒼朮各一兩龍膽草五
錢甜瓜子半盞為末每一錢半煎湯調下食後臨卧
各一服兼治時疾後餘毒上攻眼目甚効忌油麵煎炒醋
醬等物○熱極生風上攻眼痛紅絲遮睛便秘者洗所散

加^三麥^三連^三芒^三硝^三下^三之^三昏^三暗^三加^三石^三羔^三羌^三活^三石^三決^三明^三穀^三精^三草^三菊^三花^三
菴^三豆^三翳^三膜^三加^三蟬^三退^三倍^三石^三決^三明^三白^三蔞^三藜^三若^三未^三腐^三前^三疔^三瘡^三入^三眼^三
者^三洗^三肝^三散^三去^三大^三黃^三癰^三瘰^三多^三淚^三生^三翳^三者^三柴^三胡^三散^三撥^三雲^三散^三或^三神^三
醫^三散^三加^三黑^三豆^三皮^三○^三眼^三熱^三壯^三黃^三丸^三滋^三陰^三地^三黃^三丸^三益^三氣^三聰^三明^三
賜^三如^三肝^三腎^三俱^三虛^三者^三熟^三虎^三丸^三鈴^三羊^三角^三虎^三膠^三骨^三生^三地^三酸^三棗^三仁^三各^三
五^三錢^三肉^三桂^三防^三風^三當^三歸^三黃^三芪^三各^三五^三分^三爲^三末^三蜜^三丸^三皂^三子^三大^三每^三一^三
丸^三溫^三水^三化^三下^三○^三眼^三翳^三用^三羊^三肝^三煮^三汁^三入^三蟬^三退^三末^三二^三錢^三服^三之^三○^三
通^三用^三眼^三痛^三不^三可^三忍^三者^三浮^三萍^三散^三浮^三萍^三爲^三末^三每^三二^三錢^三用^三羊^三肝^三半^三
斤^三以^三竹^三杖^三刺^三破^三投^三水^三半^三盞^三絞^三汁^三調^三服^三傷^三者^三亦^三効^三○^三眼^三睛^三昏^三
白^三氣^三虛^三危^三症^三保^三元^三湯^三加^三陳^三黃^三米^三救^三之^三神^三昏^三不^三醒^三者^三死^三○^三食^三
毒^三物^三眼^三睛^三凸^三出^三者^三二^三仙^三散^三仙^三靈^三脾^三歲^三靈^三仙^三等^三分^三水^三煎^三服^三○^三
久^三不^三愈^三者^三古^三蟬^三猪^三散^三猪^三懸^三蹄^三中^三二^三兩^三瓦^三礮^三內^三塩^三泥^三固^三濟^三燒^三
存^三性^三蟬^三退^三二^三兩^三鈴^三羊^三角^三一^三分^三爲^三末^三每^三一^三字^三或^三五^三分^三或^三二^三錢^三
量^三兒^三太^三小^三溫^三水^三調^三服^三治^三痘^三瘡^三入^三眼^三半^三年^三已^三過^三者^三一^三月^三取^三効^三
惟^三過^三一^三年^三者^三難^三治^三○^三外^三治^三腫^三突^三如^三桃^三者^三護^三眼^三膏^三如^三腫^三不^三開^三
者^三用^三黃^三連^三爲^三末^三鷄^三子^三清^三調^三塗^三兩^三太^三陽^三穴^三及^三兩^三足^三心^三○^三風^三毒^三
腫^三痛^三痒^三滋^三眼^三昏^三暗^三羞^三明^三者^三秦^三皮^三散^三滑^三石^三黃^三連^三三^三味^三等^三分^三
水^三煎^三熱^三洗^三○^三受^三風^三流^三淚^三者^三用^三田^三中^三瓦^三莢^三搗^三汁^三滴^三入^三眼^三中^三

○已成翳膜者，塞牙丹者，以一錢黃丹五錢搗勻，作六丸，入砂鍋內，圓瓦蓋定，濕紙封固，以香爐盛炭火燒一日，取出，以薄綿裹之。瘡在左塞左耳，在右塞右耳，立見逐下。一方用輕粉黃丹等分，為末，竹筒吹入耳內，左眼有翳吹右耳，右眼有翳吹左耳，即退。

牙疳殺入鼻若珠

餘毒攻齒，齒腐爛生疳，殺入鼻，最速。牙齦腫痛，動

搖者，甘露飲外，以韭菜茶葉濃煎洗去腐肉，見血以溺白敷之，日三次，如爛至喉中者，用竹管吹入紅血黃水出者，可治。鼻泉發紅點如珠者，不治，其色似乾醬，二日爛一分，二日爛一寸，故各日走馬疳，宜與前五疳條同治之。

痘癰四體脾經毒

血熱引毒流傳經絡，故於肌肉虛處或關節動搖處偏盛而成癰，又有愈後餘

毒不攻，臟腑皮膚層而為諸雜病，乃注脉絡而為癰，輕者結核腫痛瘡癰而已，甚者頭頂曾腦手足肢節掀腫而作痛。○毒氣流於脾經者，癰發四肢手腕并膝臍腫痛，宜消毒飲升麻葛根湯，虛則十六味流氣飲加附子，外用馬齒莧搗汁入猪脂蜂蜜熬膏塗腫處，或用活蟬子不拘多少，以水養五日，旋取此水洗手面，漸生肌肉無痕。

肺經

手膈內穴俞

毒氣流於肺經則膈內并手肘腫流為疥癬毒宜消毒飲如聖湯五福化毒丹或用替金

雄黃各一錢半巴霜四片粒為末醋糊丸菴豆大每二三

丸量兒大小熱茶清下以利之如氣血虛者內托十宣散

加枳梗犀角咽喉不利或腫痛者并桔湯加麥門冬牛蒡

子薄荷口齒流涎血臭氣者用生地黄自然汁化五福化

毒丹一丸以鷄翎刷入口中如肺毒流入三陽皆頤項結

太腸秘結或便膿血見前雜症便血條下

毒氣流於三陽經則背頤項結核腫痛宜小柴胡湯加

核生地最妙熱盛腫痛者敗毒散加荊防腫盛者消毒飲

加忍冬藤虛者內托十宣散肉柱○通用赤芍連翹為

君桔梗甘草為臣貝母忍冬藤白芷瓜蒌根為佐上用升

麻葛根為使下用檳榔牛膝為使大便閉加大黃發熱

加麥柏不問膿已成未成膿實者宜服○虛者通用保元

湯加酒炒芩連少許久者上體宜保元湯加引經藥下體

宜活腎生湯或內托十宣散加減三豆飲不拘虛熱常

服外護筋骨免偏枯凡痘癰不問發於何經初起紅腫

却用黑豆菴豆赤豆等分酸醃研碎

時時以鷲翎刮之一切癰疽瘡毒不用針刀自潰如膿已
熟者用拔針燒紅刺之內服消毒飲在頤頤項加金銀花若
不早治必至潰爛筋骨○金華散黃丹黃柏黃連大黃黃
芪輕粉麝香為末乾糝瘡乾猪油調塗治瘡後肥瘡瘡瘡
癰疥水水疥肌餅毒○欽肌散地骨皮黃連五倍子黃柏
甘草為末乾糝兼治毒蝕不斂并瘡後膿血難滲不收等
瘡○瘡癰散用白礬為末塞入瘡內令滿以炭火燒令
礬汁盡取出為末乾糝治瘡後身上及肢節上生瘡瘡瘡
瘡水不絕此瘡方是後人巧信者縱出亦稀疎太古無瘡疹周
未秦初乃有之
初生用生地黄自然汁服三塊壳許利下惡汚亦可稀痘
○每遇冬月溫後恐春發痘宜預服三豆飲黑豆赤豆黃
豆各等分甘草減半水煮熟任意飲之凡天行痘瘡鄉鄰
盛發宜先服七日痘求不出○小兒陽盛無陰以制令頭
髮豎直飲食減少此伏熱之兆便宜服油劑麻油一盞逐
日飲盡求不出痘更服升麻葛根湯三豆飲以預防之
消毒保嬰丹纏豆藤即毛豆梗上纏繞細紅藤八月間採
陰乾一兩半黑豆三十粒赤豆七十粒山查肉牛蒡子生

地辰砂各一兩升麻連翹各七錢半荆芥防風獨活甘草
當歸赤芍黃連杜梗各五錢經霜絲瓜長五寸者二箇燒
存性煎藥須預辨精料遇春分秋分上元七夕忌婦人猶
大誠心修製為末和勻淨沙糖為丸李核大每一丸濃煎
甘草湯化下凡小兒未出痘者每遇春分秋分時各服二
丸其痘毒能漸消化若只服一二次亦得減少若服三年
六次其毒盡能消化必無虞矣錢劉陳魏皆堪法得要還美丹溪書
本胎毒毒解而氣血自伸陳魏以痘雖內毒毒出則屈丹
溪隨表裏厚實溫補解毒兼用但見熱症便用清肌解毒
甚則硝黃但見虛症便用溫中托裏甚則毒附喉法無不
善用貴得宜痘本外科傷寒之一兼內傷雜病婦女胎產
小兒驚積痘非醫之統要矣乎

○麻

麻毒原來只肺胃紅斑五六日方出

六腑腸胃之熱蒸於肺外感內傷併發與

痘症表似同而裏實異初熱三日出脹共三日出而又沒
沒而又出沒一週時許重者遍身細脹眼亦封閉有赤
白微黃不同仍要紅活最嫌黑陷及面目胃腹細密咽喉
潰爛者逆發不出而喘者即死與大科癰疹相似又與發
瘰相似但發瘰如錦紋有空缺處如雲頭狀麻即如麻
遍身無空但疎密不同耳仍有夾瘰夾丹夾瘡同耳者初

起寒熱咳嗽

初起呵欠發熱惡寒咳嗽噴嚏流涕頭眩
宜升麻湯加紫蘇葱白以解肌功忌

大汗或紅者亦宜乃麻症初起之神方潮熱盛加苓龍

地骨皮諸語調辰砂六一散咳多加麻黃杏仁麥門冬石

羔咳甚另用桑白皮散加桔梗地骨皮滑瀉合四苓散便血

合犀角地黃湯吐血加炒梅子小便赤加木通○寒熱

似癰小面赤全不思食味初起全類傷寒但面
赤中指為異耳煩喘便秘

藥甜湯已出煩燥作渴者解毒湯合白虎湯喘滿便秘者
前胡枳殼湯赤茯苓大黃甘草五味水煎服便秘

譫如狂三四日者小承氣湯乃風通聖散諸語濁秘者導赤散如
汗者四苓散加車前木通諸語如狂者解毒湯調辰砂六

三四日者小承氣湯乃風通聖散諸語濁秘者導赤散如
汗者四苓散加車前木通諸語如狂者解毒湯調辰砂六

散或時便血并吐衄

大便血或小便亦見血者犀角地黃湯合解毒湯吐血衄血解毒湯加炒

山梔重便輕者黃芩湯加生地山

梔重者京腦散加生地山梔重便

又或渴濕與嘔乾

泄瀉

湯合四苓散喘兼泄瀉者柴苓湯煩渴作瀉者白虎

加蒼湯猪苓湯○熱盛乾嘔解毒湯傷食嘔吐四君子湯

夏月因暑依嘔四苓散加人

始終雜症皆熱熾

麻症初起已出已沒

及一切雜症與痘毒大同但始終藥宜清涼雖然麻受清

涼痘受溫不易常道溫則補實則瀉醫家活法故治麻亦

有血溫而用四物湯氣溫而用四君子湯

天寒傷冷則溫中環中之藥一時之權也

沒後餘毒內攻

鑽指衣妄語昏神智

沒後餘熱內攻指衣摸床譫語神昏喪智者死如熱輕餘毒未除必先見

諸氣色須預防之始終以升麻葛根湯為主

或消毒飲解毒湯隨症選用仍忌煎腥葱蒜

小兒終

外科

癰疽總論

癰疽毒要氣血勝内外因皆濕熱凝。癰者壅也為陽屬六腑毒騰於外其發暴而所患浮淺不傷筋骨痼者疽也為陰屬五臟毒攻於內其發緩而所患沉深傷筋蝕骨凡年壯氣血勝毒則順年老毒勝氣血則險有內因飲食積毒者經曰膏粱之變足生大疔榮氣不從逆於肉理榮氣即胃氣胃和則榮衛順而滋養皮膚膏粱金石厚衣煖被以致熱熱則臟腑濕熱聚下燒燔腎水陰火熾盛入脉沸騰經隧凝滯故水穀精微不能上行陽道反逆聚肉之腠理而成癰有外感風寒濕蘊毒者經曰地之濕氣感則害人皮肉又曰諸癰腫筋癰骨痛者此寒氣之腫入風之變也蓋風濕外侵鬱久為熱自膀胱左遷移熱小腸小腸後結於臍風性上衝瘡形高色赤赤痛小則為癰大則為疽而已非若疽之白裏也亦有因心氣鬱結饑飽勞役房室過度水竭火炎痰凝氣滯而

成所謂相火能為瘡瘍諸痛痒瘡瘍皆屬心火是也因火
有若相瘡分微甚或鬱痛而不甚腫或腫而不甚痛雖
然病該三因總皆濕熱用漢云人身血行脉中氣行脉外
氣血周流不息惟寒濕搏之則凝滯而行遲火熱搏之則
沸騰而行速氣為邪鬱津液為痰為飲積久滲入脉中血
為之濁此陰滯於陽而為癰血為邪鬱敗道或溢或結積
冬溢於脉外氣為之亂此陽滯於陰而為疽蓋陽氣無形
陰血有質必濕熱淫血而後發為癰疽故局方曰癰疽皆
熱勝血也又曰二熱相搏熱化為膿蓋熱非濕則不能腐
壞肌肉為膿譬如夏熱諸物皆不壞爛壞爛者交秋濕熱
大行之際純陽炊赤潰飲易純陰色黯全不疼半陰半陽
此理甚明腫痛慢用藥回陽乃可生

癰疽有大而愈者有微如豆而死者陽發初起皮薄作熱色赤

炊腫疼痛潰後肉色紅活此為外發更加身健能食發熱
便於脉數有力為純陽易治陰發初起皮厚不熱色黯微
腫硬如牛皮不痛陷軟不化膿不潰微開潤破後肉色紫
黑此為內發未潰膿已前壞爛更加身倦少食不熱便

利麻軟無力為絕陰不治又有半陰半陽似腫非腫似痛非痛似赤非赤似清非清脈數無力如陽多陰少用藥托裏變陽者生陰多陽少用藥托亦不起投陰必死就中尤以有熱無熱為死生妙訣蓋陽症有熱則氣血行而生肌陰症無熱則氣血滯而不斂遇有熱者切不可退熱但宜溫藥清滲些小瘰毒無熱亦不妨風則多痒

氣則痛濕腫食則熱寒增多瀰疽雖止發於一經或兼二經

扶陰等症大較風氣食三種俱以不換金正氣散加川芎木香為主兼風多痒加祛風藥兼氣多痛加調氣藥兼食多發寒熱加消積藥兼濕多腫加滲濕藥又云熱瘡癰痛瘰瘡淡白風寒瘡口帶白古方外因四氣單用大黃半生半熟甘草節等分為末每空心酒下一匙以利為度
內因七情單用遠志為末酒調二錢澄清服以查數患處不內外因金石灸燒房勞因老膏一切熱毒槐花酒藥毒堅硬有如石金石藥毒石不痛宜甘草虛癰重著怕潮蒸虛勞瘦弱榮衛不滋患

右有蒸潮也治宜滋補故不可用養命丹等香燥疎泄之藥亦不可過用降火滯脾之藥惟腎氣丸括裏散甚得其宜且古方謂藥毒近骨生虫近虛漏血為虫多冷久則化勞蒸難疽極重近骨生虫近虛漏血為虫多冷久則化虛者多熱久則便細認穴道屬何經腦發屬督脉足太陽氣成漏多痛少痒細認穴道屬何經腦發屬督脉足太陽肩發手足太陽少陽經頤發髭發足陽明經腮發手陽明經背發中屬督脉餘皆足太陽經腋發手太陽經乳癰內陽明外少陽經乳頭足厥陰經腎癰足太陽經外腎癰足厥陰經腿發外足三陽內足三陰經喉癰膈癰任脉足陽明經穿襠發督衝任三脉腎癰囊癰足厥陰經內疽肺癰手大陰經腸癰手太陽陽明經胃脘癰足陽明經惟少陽少陰太陰多氣少血厥陰太陽多血少氣內皆難平惟手足陽明氣血俱多分經用藥則不犯經禁病禁以致下妄汗且瘡屬腎經者最重脾肺二經者次之他經者又次之腦乃諸陽所在咽喉飲食所通腎命根所係皆至陰之地又不可多着灸灸俗方專圖人形瘡樣而忽經絡謬哉外因寒熱宜表散毒因外

內無便溺，阻隔外有六經形在腫痛，甚飲食如常，脈浮數邪在表也。宜托裏微汗，以表散之。如發腦項背脊黃連解毒散。凡腎分內托毒活，發臂上白芷升麻湯。乳胃內托升麻湯。兩脇十味中和湯。腿外側內托酒煎湯。腿內近膝股內托底柴湯。通用敗毒散。九味羌活湯。辛熱手足太陰經分自汗浮腫流注，四服陷子。木物湯。辛溫發熱十六味流氣飲。賽命丹。暑月內托復煎散。寒月內托十宣散。或不效，金匱玉函散。丹後論形實脈虛，數冬月背生紅腫及脾骨下痛者，用桂麻各半湯。加生附酒柏仁薑仁甘草節羌活黃芩人參黃芩各半。夏連黃連服六劑而愈。此正內托法也。有謂瘡家身痛不可汗者，謂內熱痛秘急，欲行內傷飲食，發產者邪不在表而謂汗也。內熱痛秘急，欲行內傷飲食，痛異常外無六經形在內有便溺阻隔口渴煩燥脈沈實為邪在裏急與寒邪攻裏內疎黃連湯。瀉心湯。活命飲。四順清涼飲。輕者清熱消毒飲。加紫草或清心散。參之。○內積熱毒外又感邪者宜發表攻裏五香連翹湯。防風通聖散。蓋盛者解毒湯。下神。其九濕盛者除濕丹。

勞傷氣鬱無表裏邪在經中和衛

榮毒因內傷虛損房勞鬱怒而發者形雖腫痛外無六經
之形症內無便溺之阻隔知邪在經也不可妄施汗下
只宜補形氣調經脉和榮衛或專補脾胃可也鬱怒者十
六味流氣飲虛勞者托裏消毒散內托後煎散補中益氣
湯古人治癰以寒藥者正治法也治疽以熱藥者從治法
也蓋藥性熱則開行寒則踈泄疽乃有形之物非熱藥從
治豈能行之乎此內托潰後托裏排膿盡肌肉自然
內踈正治從治之義也
平潰後氣血大虛惟恐毒陷托裏之法一日不可缺也古
方托裏散托裏中湯托裏溫中湯托裏和中湯托裏
建中湯托裏抑青湯托裏益黃湯托裏益氣湯選用蓋托
裏則氣血壯而脾胃盛膿穢自排毒氣自解死肉自潰新
肉自生瘡口自斂若不務補托而誤用寒涼反助邪火膿
多臭穢甚則腐肉大潰真氣虛而死矣升溪云但見腫痛
余之脈症虛弱更與滋補乃可萬全又不可泥氣質素實
及參芪滿中滯痰也但初潰時間有執毒盛者量加消毒
清劑如發背搭肩膜破穿心必死尤宜托裏免致毒陷托
裏即護心也若毒氣上攻心神昏悶欲嘔者間服護心散

以救之如帶表邪面赤等症勢未逆也若內托復煎散或
內托十宣散暫服若無熱毒表邪但見穢氣觸犯厚熱少
食不睡者便進人參黃芪湯但見熱多心煩少睡者便進
聖愈湯但見脾虧氣弱不能生肌水飲者便進補中益氣
湯但見腎虛不能消遺水飲或補熱作渴者便進八味丸
或腎氣丸緊急不及服丸大料煎服頭防救危始終妙劑
若不務本根而專用敷圍生肌之藥則斂口大速毒反內
攻或傍邊丹發一壺者有乏或愈後而惡症頓起太命隨
去者有之惟移內治而不貴外治者為高外治初起灸最妙
形傷則痛氣傷則腫或先痛後腫傷
乎血先腫後痛傷乎氣腫痛並攻氣血俱傷皆因臟腑不
和而外治能調古法隔蒜灸法豆豉餅惟外傷成瘡者
不宜自內發者痛則灸至不痛不痛則灸至痛時左往早
覺早灸為佳一日三次十灸十活三日四十灸七活五
日六十灸十活過七日則不可灸矣其
餘點刺數透間有毒盛者量用之則可
熱痛半軟針相
當離疽毒氣已成宜托裏以速其膿膿成者當斂其生熟
淺深而針之若腫高而軟者發於血脉腫下而堅者發於

於筋脉肉色不變者附於骨也按之熱者有膿不熱者無

力于

膿按之便痛者膿淺大按方痛者膿深按之陷而不起者

膿未成按之而復起者膿已成按之都軟者無膿不痛者

血痛痛者氣痛按之一邊軟者有膿若膿生而用針氣血

既泄膿反難成若膿熱而不針腐肉益深瘡口難斂若瘡

深而針淺內膿不出外血反泄瘡淺而針深內膿雖出良

肉受傷元氣虛者必先補而後針其膿諸症自退若毒

穢盛中有肉點者宜內針膿肉外釜單巴豆膏令其點起

漸低赤處漸高六七日間赤點之處自有裂紋如刀割狀

膿肉漸潰當用拔針利剪徐徐引去若膿出肉腐腫痛仍

作必內有筋間隔宜再引之急補脾胃不痛者純用補藥

庶可收斂若妄施針刀傷肉出血斷之不止者立危其按

針用馬嘶數圍點瘡非得已人身氣血遇溫則散遇寒則

凝為之數圍點瘡非得已疑點數寒亦開塞膿理氣凝

血瘀舊肉不潰新肉不生則毒反內攻難以潰斂其則不

起必內分陰陽用藥外分陰陽敷圍內外夾攻藥氣相通

烏紗純陽症內服內疎黃連湯清熱消毒飲之類外敷

陽散半陰半陽症內服托裏消毒散外敷陰陽散純陰症

內服補中益氣湯加姜附入酒煎外敷抑陰散○點熱煙
灰膏以去惡肉藥線三品錢子以透膿管皆欲敗腐盡除
不至浸蝕筋骨止痛欬口免開張癰疽不可不痛不可大
非得已而用也止痛欬口免開張癰疽不可不痛不可大
便鈔宜山踈葉連湯解毒湯作膿痛者排之膿脹痛者針
之已潰膿出反痛者壓也氣虛四君子湯加歸芪血虛四
物湯力參芪氣血俱虛托裏益氣湯脾虛者托裏和中湯
腎虛者腎氣丸因登廁犯穢氣觸者藥中加乳香芷芍之
類和之風寒通者加防風桂枝之類溫散之燥者潤之濕
者導之果係瘀血惡肉凝滯者方可乳香止痛散和之○
瘡口不斂由於肌肉不生肌肉不生由於腐肉不去腐肉
不去由於脾胃不健氣血不旺必以補托為主而佐以行
經活血之藥則肌肉受毒者自生死者自潰又何待於點
割耶大要氣虛體倦食少者補中益氣湯血虛肺熱肉熱
者四君子湯加歸地牡丹皮膿水清稀者氣血俱虛十全
大補湯或不痛或不痛或不赤或不赤或內膿不潰或外肉不腐
者氣血兩敗桑枝灸法十全大補湯加姜桂壯其陽氣則
四畔即消瘡頭即斂若脾胃虛弱慢腫不赤者六君子湯

諸白木若初起腫痛或因尅伐及人房以致色黯而不痛者乃陽脫變陰急用古參附湯以救之問有血分虛熱者

瘡口肉色必赤四物湯加小桃連翹氣分虛熱煩渴者竹葉黃芪湯要知瘡口難斂或斂大漸開出血者危俗皆以

腫痕所至為暈非真暈也暈生於瘡口之時洗能疎毒活狀如紅筋三暈三暈向可四暈五暈者死

血氣洗藥疎通氣血體血散聚之時所賴朝夕燂醋蘸洗

延貼膏不被風寒傷膏藥多熱輕小瘡癰貼之即消發表

塞疑滯為禍不小惟瘡後只用白蠟膏婦幼患此無他與

太乙膏或水粉膏外護不致破傷風寒婦幼患此無他與

婦宜調血勿宜清水又發所患堅硬不破不腫不疼者商

小兒主去胎毒或有飲食積熱者藥稍宜清涼如素稟受

體薄及稍長而久病者仍以補托氣血脾胃為主治之

雜症仍以瘡為主潰未清心要酌量內消解毒已潰後托

裏消毒脉症俱虛者未潰前托裏消毒已潰後托裏補中
治其瘡而諸症自退瘡為本病為標若病急而元氣實暫
治其標病緩而元氣虛只治其本心通諸竅臟腑所包者
一膜耳若憂驚入心膜破必死藥中當加扶神遠志為妙

五善能食便調順體鮮不臭聲音長五善動息自寧飲食
知味一也便利調勻

二也體潰腫消水鮮不臭三也神彩精明語音清朗四也
體氣和平五也此為腑症病微邪淺若能慎節勿藥自愈

七惡皆因真氣損七惡乃五臟虧損之症外似有餘而內
實不足法當純補胃氣多有可生不可

因其惡而遂棄不治大抵元氣虛弱或膿水出多氣血虧
損或汗下失宜榮衛消燦或寒束鬱代氣血不足或峻厲

猛劑胃氣受傷以致真氣虛而邪氣實矣煩躁口乾渴非常或泄或閉或淋瀝

大渴發熱或泄瀉淋閉者邪火內淫一惡也○凡瘡腫發
熱潮煩或失血過多或潰膿大泄或汗多亡陽或下多亡

陰以致陰血耗散陽無所附浮於肌表而非火也若發熱
不寢虛熱也聖愈湯兼汗不止氣虛也單人參湯發熱煩

躁肉瞶筋惕氣血俱虛也八物湯太渴面赤脉洪大而虛陰虛發熱也古歸芪湯微熱煩躁面赤脉沉而微陰盛發躁也四君子湯加姜附○凡渴不可專沉於火若喉痛發熱便利調和者竹葉石膏湯腫痛發熱大便秘澀者四順清涼飲喉痛熾盛者活命飲膿水多者聖愈湯胃傷內津液者錢氏白朮散腎水乾涸者八味丸有先作渴小便頻數而後患疽者或愈後作渴或舌黃乾硬小便頻數而後患疽者尤其惡也宜慎服八味丸補中益氣湯以滋化源可免是患蓋疽未有不因腎虛而作切忌知母黃柏損陽氣陰氣無由而生○泄瀉因寒涼傷脾者六君子湯加砂仁或托裏建中湯托裏溫中湯脾虛下陷者補中益氣湯吞二神丸命門火衰者八味丸料煎吞四神丸腎虛不固者古姜附湯加吳萸五味子大孔痛者附子理中湯四逆湯凡癰疽嘔瀉腎脉虛者死○便秘因熱毒入臟嘔噦心逆發熱腫硬秘結固宜通之又有伏熱陽氣怫鬱而亦便秘者為邪火在經宜汗以發之潰後氣虛血涸便秘者十全大補湯或因入房傷腎便秘者加姜附以回陽氣則大便自潤凡便秘能食而肚腹不脹者切不可下若腹

痞脹而秘者，猪膽法用猪膽一枚，剪去頭入鹽醋少許，以鷲管插入膽中，灌穀道內，須臾自通。○小便淋瀝頻數，短少或莖中澀痛，皆腎虛惡症。詳四卷淋類。八十葉。潰後腫痛臭難當，腰痛血既泄，腫

臭敗者，胃虛火盛二惡也。人參黃芪湯，或十全大補湯加麥門冬、五味子，黑睛緊，小白青赤，目

不正，黑睛緊，小白睛青赤，瞳人上視者，肝腎陰虛而目係急，三惡也。腎氣丸料，或八物湯俱加炒山梔、麥門冬、五味

子，喘急恍惚喜卧床，惡也。六君子湯加姜棗，或補中益氣

湯加麥門冬、五味子，心火剋肺，金入參平，虛惡，肩背四肢

肺散，陰火傷肺，腎氣丸料加五味子煎服。重，肩背不使四肢沉重者，脾腎虧損五惡也。補中

益氣湯十全大補湯俱加山藥、山茱萸、五味子，食少嘔

藥傷寒涼，惡也。六君子湯加木香、砂仁，甚加附子，挾痰者

托裏清中湯挾火者，托裏益黃湯。○抑論：痞腫時作嘔，熱毒攻心，潰時作嘔，陰虛潰後作嘔，脾虛如熱盛，喉痛活命

急護心散作膿掀痛托裏消毒散膿熱脹痛托裏或針
以泄之炊痛便秘者內疎黃連湯其家傷胃者六君子湯
加乾姜木香木乘土位加芍藥用胃院停痰加括梗脾
虛自病或水侮土加益智仁砂仁結傷脾加川芎山梔
蒼朮香附濕氣侵胃倍白朮白朮生肌斂聲嘶唇鼻變青
口妙劑又有登則觸穢作嘔者仍宜補胃

色面目四肢腫黃

肝肺俱虛七惡也補中益氣湯加姜
朮或六君子湯加炮姜甚加附子或

十全大補湯加炮姜

陽虛寒戰腹疼汗自汗飢逆雷鳴腸

陽虛皆因
誤服寒涼

或清後勞役或吐瀉之後或誤入房夢遺或外邪所乘初

則虛火假症仍發熱頭疼良久寒戰咬牙腹痛雷鳴泄瀉

飢逆自汗盜汗陽虛寒氣所乘之症八惡也急用托裏湯

中湯後用六君子湯加附子或加姜桂甚者用大劑參苓

歸朮倍加姜附虛極發躁欲坐并暮然變瘥身反張

以手足溫為度惡寒作渴怔忡睡卧不安陽衰陰盛發躁脉洪大按之微

細或無此陽虛極暮然牙關緊急腰背反張變為瘥瘥後

結成無汗惡寒或有汗不惡寒九惡也
俱宜八味丸料加參芪歸朮大劑煎服陰虛喘熱夜不寐

消渴便汚血難藏

原稟瘦快或房慾竭精或瘡出膿多或不

不膏瘡出血紫血四物湯托裏益氣湯腎氣丸主之○便汚

黑者不治便血瘀滯者犀角地黄湯救之○瘡瘍時或愈

後口鼻吐血衄牙宜跟露皆因瘡瘍出血脾火動而錯經妄

行當求經審其因而治之肝熱則血妄行四物湯加山梔

牡丹皮黃芩白朮肝虛則不藏血腎氣丸心火不能主

血四物湯加炒黃連牡丹皮之類本脾重熱不能統血四君

子湯加炒山梔牡丹皮則不鬱結者歸脾湯加五味子脾

肺氣虛者補中益氣湯加五味子氣血俱虛者十全大補

湯陰火動者腎氣丸加五味子大凡失血過多而見煩熱

發渴等症勿論其脉急用單人參湯補之經云血生於氣

苟非其溫參芪歸朮之類以主心肝

之血決不能愈若發熱脉大者死

惡見四真惡瘡

正傳以善為順惡為逆瘡瘍仍

忌倒陷又增為九逆殊為有理

又有一般

名腫毒隨其見疔在表在裏在經用藥外以槐枝

淨後以赤小豆煮白膠合其連黃柏貝母硫黃

舟輕粉爲末麻油調搽一切惡瘡人所不識者皆

潤一_リ寸至二_ニ寸爲癰一_ト寸至五_ニ寸爲
癰五_ニ寸至一_ニ尺爲疽一_ト尺至二_ニ尺爲

竟體瘡本紫黑色堅硬已潰深陷如岩爲癰四畔生如

牛原無頭爲獠無頭面色淡紅爲爛疔知腫起爲癰沈潰

爲疔發出於外者爲外發隱伏腸胃者爲內疽癰疽疔癰疽

更輕癰癰多難治○腐多生乳脇脉踰全宜大補氣血

脾胃及蟻蟻止護膜生肌冀

其萬一○療病兒後起身部

腦發五種
木上與腫
鬚疽
頭上瘡

頭瘡 風瘡 耳瘡 附_利侵_滲瘡 月蝕瘡

肉上疳瘡

疥癧
癰癧

痰核

癭瘤

腦後頸後頭心發六腑陽壽好上蒸

六腑陽毒聚頂惟大陽膽所主之穴惟大陽膽

火濕熱上蒸於腦古謂發腦發鬢發眉發頤發背謂之五
發至傷凡眼不見痛皆惡○有生於兩邊髮際穴者如有
核宜取核以去病根○有生於腦心者四邊腫赤連耳項
不急治膿水從頭中而出血逆痰起不治○有生於頤後
者瘡頭向上瘡尾向下形如蜂窠乃反症也掀腫者急宜
托裏散加升麻赤芍桔梗防毒攻心如痰發或流入兩肩
前不治○有生腦後對口者名曰天疽其狀大而色紫黑
不急治熱入淵脈前傷任脈內薰肝肺十餘日而死○有
生耳後一寸三分至命之處名曰發頤又曰銳毒凡頭上
癰疽宜服降火化痰消腫托裏之藥不可甘炙惟初起隔
蒜灸之則可但艾炷宜小而少勢成者外敷南星膏或陰
陽散歟口古香柳散若熱上蒸連頤而發必主穿喉而
死
癰腫納冷真熱症
癰腫作痛煩渴好飲冷水宜解毒湯
加天花粉以除熱久瘡熱或黃連消
毒散當歸羌活湯清熱
消毒飲活命飲選用
口乾飲熱腎虛情
腫痛口乾作渴
好飲熱湯為腎
陽虛火熾宜托裏消毒散托裏益氣湯腎氣丸八味丸慢
腫微痛少食者補中益氣湯痰多者托裏清中湯若色黯

不潰不斂為陰精

消渴各器燥不浴頭瘡風屑疥軟癰總是濕熱症稍輕頭

宜內服酒歸飲外用雄黃水銀各等分為末以臘月猪脂

半生半熟和勻洗淨敷之濕爛者用燕窠土黃柏為末乾

疹痂高者用黃蠟瀝清同熬敷之○頭上風屑白屑極痒

宜內服單苦參九下虛者薄荷茶外用藜蘆煎湯避風洗

頭候稍乾分開頭髮仍以藜蘆末糝頭皮上綰帕緊縛兩

日夜頭風亦効○禿瘡初起白團瑛剝如癬上有白皮久

則成癩遂至滿頭生瘡中有膿孔細虫入裏不痛微痒經

久不瘥宜內用通聖散酒拌除大黃另用酒炒共為末再

用酒拌令乾每一錢水煎服外用紅炭淬長流水洗去瘡

痂再用淡豆豉一合炒令煙起色焦至塵一團飯飲調劑

炭火煨令灰燼等分為末入輕粉少許麻油調搽如有熱

加黃連寒水石有冰加枯礬有虫加川椒麝香少許腫厚

加消皮烟燭烟膠香爐蓋上香膠如久不愈有虫者摩風

膏加黃柏黃丹烟膠各一兩二方用鹽烏魚頭燒灰麻油

調搽軟瘡用抱鵝卵壳燒存性入輕粉黃連裁半為末

清酒調敷外腎生瘡亦効愈而再作者用野蜂房二箇燒

在作爲末以巴豆壯粒去壳煎清油二三沸去豆以清油調敷或枯礬亦好多年不愈者用猪頭上毛猪頭上毛各一握燒存性鼠屎一粒爲末清油調敷或加輕粉九炒如暑月生瘡用木槿花搗爛敷之最妙

大頭腫痛

又名雷頭風

時行毒

濕在高巔之上故頭面痛腫症瘡甚則咽嗌堵塞害人最速冬

溫後多病此症似傷寒寒身痛

治分表裏三陽

連兩目鼻面腫者陽明也發耳前後并頭

角者少陽也腦後項下腫起者太陽也脈浮表症多者清震湯或敗毒散加荆防脈沉裏症見者宜羌活黃芩俱酒

炒大黃酒蒸爲主陽明加葛根升麻芍藥石膏少陽加瓜蒌仁牛蒡子太陽加荆芥防風水煎時時呷之取太便秘邪

氣去則止甚若加芒硝或防風通聖散加牛蒡子玄參俱用酒炒微微下之咽喉腫痛者用姜蠶一兩大黃二兩蜜

丸如彈井水化服商荒勞役宜普濟消毒飲以安裏虛者加參歸便秘加大黃或人中黃丸亦妙服後俱仰臥使藥

氣上行故非便秘熱表裏症罷腫不消磁鋒去血通關搗盛忌用降下之藥

表裏俱鮮腫不消者破去血外用通關散倍羊躑躅及蒜蘆少許搗碎定以泄其毒久不愈欲作膿者內服托裏消毒散體倦食少惡寒者補中益氣湯加桔梗潰後腫赤不消膿清色白者六君子湯加桔梗芎歸元氣素弱脈微者用參朮芎歸陳皮柴胡升麻甘草各等分以升舉陽氣用牛蒡子玄參連翹桔梗減半以解熱毒腫赤便屬純陽脈微便屬純陰慎之

癰疽 肝膽之怒火或因風熱藥同裏

怒火風熱俱宜柴胡清肝湯腫痛甚者活

命 飲腎虛血燥日晡潮

腎水不能生木以致肝膽火盛血燥及頭目眩痛者四物湯加玄參柴

胡 桂梗芽草風熱連頭面咽牙痛者

汗多喘渴脾勞過因

犀 角升麻湯血虛者四物湯加參芪

役 腫痛寒熱喘渴自汗者補中益氣湯去升柴加五味麥門冬炮姜

耳瘡 三焦肝風熱

耳瘡發熱掀痛屬三焦厥陰風熱者柴胡清肝湯桅子清肝湯中氣素虛者補

中益氣湯加酒炒山梔黃麥冬牛蒡子寒熱作痛屬肝風熱者小柴胡湯加山梔川芎

血內熱痒痛出膿寒熱濕熱數牽引骨脇脹痛屬肝火血虛者八味逍遙散

火動切忌風藥劫耳內痒痛出水喜冷銀簪探入屬腎經

耳邊侵淫瘡出黃水者用殺羊頭荆芥棗肉等分燒灰入

臍粉為末麻油調搽○月蝕瘡生耳鼻面間及下部諸瘡

燒灰一錢屬少許為末先用鹽水洗淨搽之或麻油調搽

內疳瘡生於口上腫治以鈎刀并鐵烙敷以雄粉支其牙

最是虛勞元氣薄初發如蓮花根帶小而下垂乃大治法

雄黃輕粉粉霜日止自斂為末敷之以槐枝作枕支其牙

頻間再使口合二兩時許瘡癰定合口自便次日出膿以

生肌散敷之上

腫多骨疽見後

痲腮

同

風熱犯其胃表分寒熱裏不利

外因風熱

麻胃風湯在裏二便不利者因麻清涼飲如表裏俱解腫痛又不消飲作膿也托裏消蓋散治同大頭腫積熱

腫痛頗難當

用升麻黃連連翹牛蒡子白芷等分水煎服

連耳上太陽部分腫屬風熱加羌活防風連耳下少陽部

分腫屬怒火加柴胡山梔牡丹皮連耳後少陰部分腫屬

相火加知母黃柏頭面齒牙俱腫內熱口乾者犀角升麻湯齒牙唇口俱腫出血者清胃散加石膏

肉寒不潰宜補劑

內傷生冷涼藥不能消潰食少體倦者補中益氣湯內傷氣血俱虛者八物湯如麥門冬五味子

傷七情有寒熱者八味逍遙散傷色慾連服及耳後腫者腎氣丸八味丸十全大補湯不可誤用風藥尅伐之劑

痲癰馬刀屬少陽風熱痰氣結核

生頸前項側結核

生胃脇腋下堅硬如石形如馬刀尖曰馬刀多氣少血之

病總皆手足少陽相火所主蓋耳前後與缺盆肩膊上臂下

屬足少陽部分延及頰頰頰車與頰屬足陽明部分延及
胃中中府雲門肺經部分者死風癰大而小熱癰癰腫赤
色又各血癰癰腫推動滑快氣癰實者化痰通經脉清肝
圓而動又有鼠成癰大小不一

養血是上方

無痰不成核諸癰初起實者皆以化痰為主
通用二陳湯加防風桔梗黃芩竹瀝胃緊者

以此探吐尤妙

通經脉必用瑛錯疎滲小使以瀉心火

古方必効散立應散是也但此二藥其效脈後宜量體調

治體實風熱盛者繼以宣熱舟服之體虛者比裏益氣湯

或八物湯合二陳湯服瘡口自斂又有虛甚者宜先服

健脾藥而後服二散輕者只用瑛雞丸便堅胃盛者白蘇

丸或追曠化毒散散硬皂子丸少陽分者柴胡通經湯陽

明分者升麻調經湯少陽陽明二經二湯合服調之誤下

則犯經禁病禁二清肝者膽與肝合病則筋累累如貫珠

寒熱燉痛乃肝氣動而為病也當清肝火為主佐以養血

若寒熱止而瘡不愈者乃肝血燥而為病也當養血為主

佐以清肝清肝荃葉湯梔子

清肝湯葉胡清肝湯選用虛火滋潤肺脾腎瘡如豆粒

附筋肉色

不變內熱口乾精神倦怠久不消清及肝腕弦緊腎脉洪
數乃腎水不能生木以致肝火動筋攣忌用風藥燥肝
經又爛破膿血大出者解腎愈肝火炎於肺皆宜腎氣丸
補中勝毒餅為主兼服逍遙散加桔梗麥門冬玄參以清
肺火多怒有肝火者清肝解鬱湯有寒熱者單夏枯草散
肝火旺甚或近骨處生虫作痒者蘆薈丸通用貓頭丸海
藻散堅丸外治銀右散鐵蘭散貓蝠散成瘻濕水補且防
虛弱者單夏枯草膏內服外貼加麻油
瘻即漏也經年成漏者與痔漏之漏相同但在頸則曰瘻
漏在痔則曰痔漏治法則一初起者宜溫散風冷及行腎
經濕熱邪水久則大補氣血兼用薰洗平肌寒熱之藥
方自乾散治瘰癧成漏以其有牽牛能利腎經惡水免土
淋瀝穿穴但利後當量體調治
痛節酒色財氣九漏治詳前條
潮者可治經閉有潮或咳者死古方用王蠟散治瘰癧和
血通經服之自消日進一服七八日見効便不用者胡
通經湯升麻調經湯又虛者加味道遙散清肝益榮湯或
用二陳湯合四物湯加牡蠣柴胡黃芩玄參神麴為末以

桑椹膏搗丸，菴豆大，每五十丸，溫酒下，或腎氣丸尤妙。

男子潮咳是真傷

瘰癧傷症之標也故

房瘰癧類有日，腹中有塊，頸上有核，最為難治。況成潰漏而不清，金降火滋腎健脾病人，又不清，心淡口則潮汗咳瀉惡症蜂起，其可生乎？但視其目內赤脈貫瞳人，有幾條則知其幾年死，面色眊白金，尅木脈洪大為元氣虛敗，俱為不治。故曰實者可治，虛者可慮。

痰核

在頸全不痛

乃痰聚不散也，不可誤用瘰癧藥治。宜

二陳湯加大黃連翹柴胡桔梗，體薄者二陳湯加桔梗黃

芩玄參麥門冬及防風少許，入竹瀝多服，自消。如耳後項間各有

一在臂或痛亦不紅

臂核或作微痛者，以內無塊者含化。凡

腫皆然。宜陳皮半，夏茯苓防風酒各一錢，連翹二錢，通

皂角刺一錢，半川芎蒼朮各五分，甘草二分，水煎服。

遍身有塊多是痰注，但在上體多兼風熱在

下體多蒸濕熱宜加味小引丹竹瀝
建痰丸量體虛實服之通用海帶丸

癭瘤有五應五臟
舊分五癭六瘤惟薛立齋止言五癭蓋

癭瘤本共一種皆痰氣結成惟形有大

小及生頸項遍身之殊耳立齋云肝統筋熱動肝火血燥

筋攣曰筋瘤心主血勞役久動陰火沸騰外邪所搏而為

腫曰血瘤脾主肉鬱結傷脾肌肉消薄外邪搏而為腫曰

肉瘤肺主氣勞動元氣騰理不密外邪搏而為腫曰氣瘤

腎主骨勞傷腎水不能榮骨而為腫曰骨瘤瘰之各有五

者此也仁齋云筋脉呈露曰筋瘰赤脉交絡曰血瘰皮色

不變曰肉瘰隨憂愁消長曰氣瘰堅硬不可移曰石瘰走

癭瘰之名有五者此也瘰癧俱內應五臟藥治相同

通身癭頸項
癭瘤所以兩名者以癭形似櫻桃一連縱大

亦似之槌槌而垂皮寬不急原因憂悲所生
故又曰癭氣今之所謂影囊者是也瘰初起如梅李皮嫩
而光漸如石榴小蠶之狀原因七情勞忿復被外邪生痰
聚痰隨氣留住故又曰瘰癧總皆氣血凝滯結成惟憂悲
結傷心肝故癭多着頸項及肩旁慾邪氣乘經之虛而住

故癰腫之處養之。雖無痛痒有虛實散堅行氣不可妄。癰腫或軟或硬無痛無痒

體實者海藻散堅丸。海帶丸。癰火盛者。抵掌散。神効開結散。此皆化痰行氣破堅之劑。久虛者不可妄服。虛者筋癰。腎氣丸。或八物湯。加山梔木。瓜炒黑龍膽草。肝火盛者。間以蘆薈丸。暫服。血癰。四物湯。加茯苓。遠志。肉癰。歸脾湯。補中益氣湯。氣癰。補中益氣湯。骨癰。腎氣丸。補中益氣湯。○通用初起者。十。六。味。流。氣。飲。單。蠅。蛛。方。稍。久。若。蠟。磨。丸。常服。自然縮小。消磨外敷。南星膏。切不可輕用針刀。決破。破則膿血崩潰。滲漏無已。必至殺入。但有一種脂癰。紅粉色。全。是。痰。結。用。利。刀。破。去。脂。粉。則。愈。或。有。如。茄。垂。下。根。其。小者。用藥點其蒂。俟茄落。即用生肌。斂口。藥。敷。之。防。其。出。血。

手部 天蛇頭 甲疽 代指 驚掌風 紅絲瘡

疣屬肝膽小腸經。多患於手背及指間。或如黃豆大。或如聚粟。或如熟椹。按之則絲長三。四。寸。許。

又曰。手風熱怒火或亡精。風熱血燥。筋縮者。八味。滋。陰。散。和黃連。或清肝益榮湯。怒火者。

柴胡清肝湯亡精腎枯筋縮者腎氣凡

切忌寒涼繫與灸誤犯出血必傷生

誤用寒涼降火之藥及蟬螂蝨絲羅荒花漿線繫着艾灸等法輕者反劇重者大潰腫痛發熱出血而死慎之

甲疽惡代雖害事不似癰掌風難平甲疽乃毒氣攻於手足指旁肉裹上指甲

疼痛出血瘡中有虫或因剔甲傷肌或因甲長侵肌遂成

腫痛俱用綠礬五兩置鉢上以炭火封之吹令火熾其

若即溶流出赤汁者是真候流汁盡去火待冷取為末色

似黃冊收之先以鹽湯洗拭後用綠礬為君入乳香少許

較之重者用綠礬五錢蘆薈一錢半麝香一字為末以絹

袋盛藥納所患指於袋中線札定以瘡為度○代指指頭

先腫焮熱掣痛然後於爪申邊結膿甚者小甲俱脫先用

芒硝煎湯淋洗然後用烏梅核中仁為末米醋調成膏入

指漬之自愈或用猪脂和蚯蚓搗爛敷之○天蛇頭瘡生

手指上或足瘡傍一塊開口腫痛用鷄母楊根攷醋浸一

宿即消或以雄黃入鷄子內以患指浸其中一宿次早更

以蜈蚣燒烟薰病指一二次即消如痛甚流血不止者用

雄黃蜈蚣全蝎為末搽在瘡上却以少油抹瘡上止之○
驚掌風癰用猪前蹄爪破開入菊花蒼耳末以線縛定收
爛食之次日用白鮮皮皂角雄黃各五分鉗製水銀三分
為末臨夜用鵝脂姜汁調搽次早以沙擦去然後量體服
去風之藥此癰乃楊梅瘡類如多年不愈者先用磁鋒磨
刮次以草麻子一兩枯礬二錢為末桐油調搽火烘極熱
再以棗肉三兩水銀五錢枯礬三錢搗爛如泥每日搽手
下餘下次以肥皂酒糟洗淨十次神效更灸勞宮或內關
一穴斷根○又方桐油調密陀僧末搽掌外用水龍骨火
燒烟薰之治手足掌風及腳花癰更以樟葉煎湯洗之

紅絲瘡最害人速或生於手或生足發疱初黃變紫青絲

逆入心毒入腹紅絲瘡因喜怒不常血氣逆行而生於手

絲逆逆血上而生若至心腹則使人昏亂不救或有生兩

三條紅絲者急以針橫截紅絲所到之處刺之令其出血

以膏藥貼或嚼碎
草根敷之立愈

胃腹部 乳癰

胃癰

肺癰痿

腸癰

心癰附腸癰

腹癰

乳房癰胃乳頭肝

婦人之乳男子之腎皆性命根也

病初嘔渴增熱寒

渴

嘔吐者膽胃風熱也甚則毒氣上衝咽膈妨碍寒熱者肝

邪也此皆表症宜不換金正氣散加天花粉能止渴嘔定

寒熱咽膈有碍者甘桔湯加生薑

或護心散煎後見此四症為虛

婦人胃厚多憂鬱火化

汁濁塞竅端結核有兒吹熱氣

飲食厚味忿怒憂鬱以致胃火上蒸乳房汁化為濁

膿肝經氣滯乳頭竅塞不通致令結核不散痛不可忍初

起便宜隔蒜灸法切忌針刀能飲者一醉膏加芎歸各一

分一服兩服即効不能飲者瓜蒌散

○結核亦有氣血虛

蜀椒被外感內傷以致痰瘀凝滯俱以古芷貝散為主血

虛合四物湯更加參朮柴胡升麻氣虛合四君子湯更加

芎歸柴胡升麻憂思傷脾者歸脾湯加瓜蒌根貝母白芷

連翹甘草節水酒各半煎服有肝火結核腫痛甚者清肝

解鬱湯○吹鼻因乳子膈有痰滯口氣燥熱含乳而嘔風

熱吹入乳房凝住不散作痛初起須忍痛揉令稍軟吸令
汁透自可消散不散宜益元散冷姜湯或井水調一日一
夜服三五十次自解重者解毒湯頓服之挾氣者古芷貝
散并青皮湯外用漏蘆為末水調敷又有乳汁不行妳乳
脹痛者核久成癰硬腫漫核久內脹作痛外腫堅硬手不
動泉散核久成癰硬腫漫可近謂之乳癰未潰者仍服瓜
蒞散內托升麻湯或復元通聖散加藜蘆虛者托裏消毒
散將潰兩乳間出黑頭瘡頂下作黑眼者內托升麻湯已
潰寒熱者內托十宣散少食口乾者補中益氣湯哺熱內
熱者八物湯加五味子胃虛嘔者六君子湯加香附砂仁
胃寒嘔吐或瀉者六君子湯加乾姜藿香遇勞腫痛
者八物湯倍參芪歸木遇惡腫痛者八物湯加山梔又有
核小全不痛久則潰漏療益其子大不痛不痒五七年
後外腫紫黑內漸潰爛名曰乳癰滴盡氣血方死急用十
六味流氣飲及單青皮湯兼服虛者只用清肝解鬱湯或
十全大補湯更加清心靜養庶可苟延歲月經一年以後必
於乳下潰一穴出膿及中年無夫婦人死尤速故曰夫者

妻之天惟初起不分屬何經絡急用葱白寸許生半夏一
枚搗爛為丸炭實大以懸裹之如患左塞右鼻患右塞左
鼻二宿

而消男兒乳疾何須怪怒怒損傷精血乾男子乳疾治
與婦人微異

者女損肝胃男損肝腎蓋怒火房慾過度以致肝虛血燥
腎虛精快不得上行痰凝滯亦能結核婦人胎產後亦

有肝虛者大槩男子兩乳腫者瓜蒌散十不味流氣飲左
乳者足三陰虛鬱怒所致八物湯加山梔牡丹皮或清肝

解鬱湯火盛風熱者更加炒黑草龍膽五分腎虛者腎氣
丸食少作嘔胃脇作痛日晡頭疼溺澀者六君子湯加芍

歸柴胡山梔潰爛作痛者十全大補湯腎氣丸因勞怒則
痛并發寒熱者補中益氣湯加炒黑山梔不可輕用清熱

敗毒之劑

肺癰因痰火益炎經年久咳熱極葉焦而為癰猶草木元

甚則枝葉萎落也火燥甚則腐脹為膿

血成癰病因汗吐下後亡津或腎虛火炎或厚味薰蒸而

成其候惡風咳嗽鼻塞流涕項強不能轉側皮膚不澤

胃

成

其

候

惡

風

咳

脇脹滿呼吸不利吐痰血腫癰口乾燥痰涎粘膿成胃痛或開竅調和

金水胃脾兼

肺痿脈數而實寒熱往來自汗咳嗽口干涎多知母茯苓湯主之如咯血將變癰者紫苑

散火盛者人參平肺散為丸含化虛損者切勞散虛冷不

溫者炙甘草湯加乾姜喘急有寒邪者小青龍湯喘急而

浮鼻塞智服者古亭棗散是知肺痿有寒有熱而以清金

降火豁痰為主也○肺癰脈數而虛口燥咽乾胃脇隱痛

二便赤澀咳嗽膿血腥臭置之水中則沈枯梗湯主之如

吐膿者消膿飲咽痛者其桔湯便秘者太乙膏為丸白湯

下又有胃脇間開竅口中所咳膿血與竅相應而出者

宜大補氣血血多者梅豆湯冷熱不調者雲母膏為丸其

性湯下痰多少食者托裏清中湯咳嗽短氣弱少者參芪

補肺湯脾虛少食者參朮補脾湯七情饑飽勞力傷脾肺

者團參飲子咳嗽痰壅者腎虛也腎氣丸口乾燥者虛火

也八味丸去附子加五味子有吐膿血如肺癰口臭諸般

藥不效者消風散加髮灰米飲下太槩面赤當補脾腎而

白當補脾肺蓋補脾以生肺金補肺以生腎水也如陰火

發熱咳吐膿血痰如糯米粥脉浮大者死若膿血自止脉浮短瀼者生

心癰胃發名井疽

胃乳間生蜂窠癰發各井疽狀如豆天三四日起不早治入於腹十日死外

發可治內傷殂降火清心為要藥

心熱盛極急用陳慆心火之藥遲則不救小便

澁者清心散或赤膈散去硝黃加白芷天花粉瞿麥木通

大便秘者內消清心散或赤膈散去硝加白芷天花生地

脇癰一樣忌補虛

初起神効瓜蒌湯或柴胡清肝湯蓋胃

濕後方敢清熱托裏兼滋腎水誤投熱藥易傷骨膜慎之

成老教之即安

成老教之即安

胃癰胃熱咳膿血人迎反盛胃脉沈

胃脘癰因飲食七情火鬱後被外感寒氣

所隔使熱濁之氣填塞胃脘胃中清氣下陷故胃脉沈細惟寒氣所隔故人迎緊盛有此二脉者胃癰真也

寒

熱如瘡皮毛縱先宜疎利次補升

外症寒熱如瘡胃弱則肺金失養故身皮錯縱

或咳或嘔或噎膿血俱大射于湯主之胃火盛者清胃散
痰壅者甘桔湯大便不利者太乙膏為丸服小使不利者
三仁湯內痛者失笑散虛而痛者牡丹散膿出食少者補
中益氣湯升提胃氣或佐以前藥調之不可專治其瘡

腹痛若淋濕熱注內膜其若腹脹有水聲便

膿膿瘡皆敗壞

濕熱鬱積成癰瘡火盛者脈數而滑挾瘀血多者脈數而孔外症小腹腫痛按之則

痛小便赤若淋似奔豚發熱惡寒脈遲緊者未有膿也

黃湯或五香連翹湯下之不敢下者敗毒散加秦艽連翹

脈孔滿者四物湯加桃仁紅花玄胡索木香脈洪數者已

有膿也三仁湯神効瓜蒂湯小腹痛小使不利者膿壅

滯也牡丹散若腹脹大轉側間有水聲或問有虛冷皮甲

錯脫皮似腫按軟弱中無積聚外無潮脈數還宜用溫藥

脉數外無潮熱內無積聚身皮甲錯腹急如腫按之却軟
乃內虛陰冷疑痰成癰牡丹散或內托十宣散加茯苓其
者敗毒散以之又有冷熱相交併消瘰癧和中後補托熱症用
雲母膏為五牛膠煎酒下利去痰膿則愈其間有痛甚太
便從小便出者亦宜如下膿過多者梅豆湯合其結湯和
之蠟藥丸左後內托十宣散或八物湯補中益氣
湯以固本元氣後却宜靜養若動作躁暴或被驚恐則腸
斷而死九癰生小腸分尤可大腸
分近小門者難治肛門破者即死

腹癰腹痛關脉數飲食七情火滯者

腹癰生於肚腹皮裏

腹痛甚若是也膏粱七情火鬱以致脾虛氣滯而成無膿
小兒多因驚積虧損而成食積病氣相類不可誤治

腫硬色如常

慢腫堅硬肉色不變未有膿也四君子湯加

氣寬也先用活命飲隔蒜灸以膿成腫軟色若

殺其毒後用托裏散以補其氣腫起而

赤者膿成也。托裏清毒散若膿成而不外潰者，氣血虛也，用針刺之。潰未皆宜壯胃元行經活血忌涼藥。不問初起已潰未潰俱宜壯胃元氣而佐以能潰潰不能斂壯者難治未弱立死若魯經誤下及服降火破氣消痰之藥，未劑參芪姜附或十全大補湯救之。呼嗟九疔認亦難按大方知醫經絡中府屬肺巨闕屬心中腕屬胃京門屬腎天樞屬大腸丹田屬三焦關元屬小腸每穴內隱隱痛者為疔肉上微起者為癰假如中府隱痛者肺疔也上肉微起者肺癰也各穴微起此十不味流氣熱或托裏散加當歸山楂黃芩杏仁

背腰部

背發七種
腰發二種

發背五臟毒蘊成七情六慾外邪并

背雖膀胱督脈所主然五臟皆係於背或

醇酒厚味或鬱怒房勞以致水結火炎痰凝氣滯或受外邪與毒相搏隨處發生

肩下脊上脾家

毒

發在脊下脊上乃因飲食感毒廣一尺深一寸雖潰在

藥

恐毒奔心太要服藥截偏右蓮蓬子內生蓮子發生於

蓮

蓬內有子孔恐其毒奔入心太要用托裏散如太

初起

汗即散火點或內服追疔湯汗之即散左搭右搭肺

肝

情右搭肩發骨上生者以動之應可治若串左有難治

二症

內服托裏散加升麻桔梗用去惡毒中蜂窠防膜

散

或綿絮燒灰為末糝之若麻油調搽

透

蜂窠發正當脊心形如蜂窠有孔在上者不宜最為反

未發

症宜托裏散加菊花生肌定痛防毒攻心難治因心火

故也

對心火毒太相凌生於此其毒壯盛走暴急用疎瀉

藥

解之散走流注風熱盛散走流注發毒氣乘風熱而走

急宜

疎風定熱治之則氣自息

若流注於手少陰氣食陰虛龜見形此發頭尾俱尖四逆

致而氣食相開合陰虛而成之氣虛而散者所以開口而潤急服托裏補藥腎俞滋熱生發

房怒兼之雙發平腎俞發因受濕并怒氣飲熱酒傷於內

若腎經見有濕熱更加房勞腎怒過度則兩腎俞火生發陽發於外者可以治陰發發於內者可以治陽發

俞下發肝腎上發肩膊上又生一發亦謂之雙發難治治炊腫湯炊腫發熱疼

脈滑數有力先服活命飲用托裏消毒散慢腫不熱微

疼色黯作渴脈數無力者腎虛也托裏散少食者六君子

湯加姜補熱陰虛者四物湯加參朮或腎氣丸惡寒熱四

邊熱大者陽氣虛也單人參湯十全大補湯小使變數者八味丸初起食少者那盛脾虧也急用補中益氣湯救之

托藥不應者乃毒騰氣血死在旬日或已發出而不腐潰者須急用托裏藥兼補脾胃不應死在二旬若已潰而色不紅活者用托裏散加參芪肉桂及補脾之藥却不生肌瘡口黯暈大而不斂乃脾崩也死在月餘

腎腿部

腎癰附腎蛆瘡 便毒 路岐 懸癰附穀 遺中瘡 痔 漏 陰瘡 陰囊癰附

小兒陰囊生瘡 婦人陰瘡附交接出血 附骨疽附腿 上寒濕瘡 林瘡

腎癰太陽部位與雖然多血氣罕到腎居小腹之後部位

既至到血亦至來中 陰虛濕熱是病根肉托固裏性無躁

年患此誠為可慮 初起未成膿者開其灸并引熱使飲作膿者內托若活

腸痛甚若活命飲腫硬痛者托裏消毒散微腫痛者托裏 散腫虛不能消散或食少不化膿者六君子湯加芍歸黃 芪偏右腎腿者左宜腎虛不能消散或作渴溺淋者腎氣

九石肝虛誤服清瀉藥以致氣陷下腫痛甚者補中益氣
湯或十全大補湯後尤宜進此二藥以固其裏兼補血
色戒躁暴乃可萬全○醫家第痛痒者摩風膏只此其有
重者用硫黃下兩人言一錢為末用醋調勻慢火熬乾復
熬化如灰起將醋酒數次傾地下待冷成餅
用麻油磨濃候瘡痒抵破搽上三日即愈

便毒為疔原陰肝

俗云便毒為血毒也生於腿膝小腹之
間乃原陰所經及衝任督三脉敗毒乃

精氣出入

之路也房慾強精只一端

或入房忍精或思色下遂或
當此不固敗精凝滯為無腫

痛在路腹之間先用五寶散利去敗精使秘加入黃有寒
熱者小柴胡湯加山梔澤瀉後用腎氣丸以補精氣逐瘀

血濕熱因勞或被冷補瀉方詢便易

難內有濕熱外被寒
邪相拒敗毒不得

散治宜清肝火活瘀血滲利腎經邪水體實二便難者兩
解湯入正散按鬱怒者流氣飲子或復元通氣散加天花

粉白芷青木香腫痛甚者活命飲濕熱壅滯者龍膽瀉肝
湯厚太便易而小便澀者小柴胡湯加芍歸知柏澤瀉

或神效。瓜蒌湯加柴胡、山梔、痛甚者，活命飲去大黃。○濕熱因勞倦氣滯者，補中益氣湯，後俱宜托裏散。八物湯加柴胡，或十全大補湯。久欲成漏者，爛磨丸。○單方用紫花地丁、搗酒服，最妙。騎馬兩邊異名，兩便毒，左右兩邊俱發，或先有痔瘡而發，或卒然起，核疼痛而發，用藥同前。古方初起宜國老膏入皂角炭少許，主之外，用厚尾草煎湯洗淨，以明松香為末。路歧些小跨襠間，日三次乾擦，自能愈。後仍戒房室行動。腫痛者，內服單蛇珠方。外用炒葱熨三五次，後以酒毒消腫藥加大黃、木鱉子、南星、草烏敷之。破者用生肌散。此症小兒患之多。因食積痰滯。

三陰虧損

生穀道前陰囊之間，初發甚痒，狀如松子，漸如蓮子，日久如桃李，加以赤腫，甚

破則大小便從此

輕則漏瀝重即殞

輕則瀝盡氣血而亡，重則內潰即死。初

起量與痔濕熱

初起濕熱壅滯，作痛，漏溢者，活命飲去大黃，或龍膽瀉肝湯。

大補氣血

猶恐耽不成膿不潰若人物湯膿已成者急封之欲其生

虛者四君子湯加芍歸脾虛者補中益氣湯久成漏者十

全木補湯蟬蟬九此疾首尾常服固老膏雖患亦輕雖潰

亦淺誤用寒涼則不可按○穀道中生瘡用

水中荷葉細搗綿裹納下部日三次即愈

五痔原因食色傷

經曰因而飽入房精氣胎泄熱毒乘虛下注

一虛肺金失養用不寡畏風邪束出下流輕則腸風下

血重則變為痔或醉飽入房精氣胎泄熱毒乘虛下注

或淫慾入房過甚傷筋忍精停毒其則以男交男致傷筋

脫與腎肝筋脉蓋膀胱筋脉抵腰絡腎貫腎走肝環前後

二陰故痔乃筋脉病發則面青痛甚肝苦急也○五痔壯

痔肛邊如鼠乳此痔肝邊一救生膏陷入腸痔結核腸內

脫肛出血血痔太便清血隨下如射線脉痔腸口頻頻發

露出而且痛且痒五痔散主之又有氣痔肛門腫痛便難

雖力則肛出不取加味香蘇散酒痔飲酒則發乾葛湯重

痔侵淫濕爛歲積月累蝕腸穿次蠟皮丸黑玉丹凡毒深

大如鵝冠蓮花枝桃毒淺者小如松子牛

乳心胃乳櫻桃雖三種種不同皆三陰虛也濕熱風燥毒

出膿血水者熱勝血也痛極者火熱也痛痒者風熱也太

便秘者燥熱也小便澀者肝火濕熱也又瘡頭向上或硬

或軟者熱多涼血和氣清濕熱潤燥疎風止痛痒

益則傷血血滯則氣亦不運而大腸下墜作痛大麥以

肥花視角生地求血等歸桃仁和血生血枳壳行氣寬腸

芩連山梔清熱黃柏防已澤瀉行濕麻仁太黃潤燥秦艽

荆芥疎風風邪陷下久者防風升麻提之氣弱若人參黃

芪補之氣不順者木香檳榔和之古方熱痔黃連阿膠凡

清心丸槐角丸槐膠丹濕熱加味連壳丸或四物湯合敗

毒散風濕秦艽湯燥痔四順清涼飲下血者等歸丸

苦參丸痛者止痛丸痔者黑玉丹腫硬者野梔丸

割剔終有害刀割線剔損臟傷命藥點藥敷閉毒變漏初

起只宜蒜灸已成者防風荆芥槐花木鱉朴

外法

硝煎湯熏洗滑脫加文蛤蓮蓬洗後用古熊脂膏蜈蚣油塗之內痔宜內生肌丸忌擦藥斷根滋補忌

寒涼體實屬肺與大腸風熱者加味槐角丸加味地黃丸三神丸斷根更易體薄屬肝脾腎三經陰精損者腎

氣丸補中益氣湯十全大補湯以滋化源更節嗜慾謹此居方可斷根又有兼下痔瘡者有莖中出白津者有兼疝

者皆肝腎不足變出勿專服寒涼湯火○蜈蚣油端午取大蜈蚣一條付炭灰乾研末一土煨存性桐油調塗輕

則不發重則次手為過日又發再剪一寸煨塗斷根又法用生蜈蚣數條浸麻油內候生蠶畧熬化塗痔及諸瘡解

九漏須知初與久凡癰疽久則宿膿腐肉傳蓄其間穿孔必深風冷外侵消洎膿腰流出如鉅瓮

之有漏孔九漏肝主狼漏胃主鼠漏大腸主蟻漏肺主蚘蟬漏心主蟻蠅漏膽主浮蛆漏腎主瘰癧漏

小腸主轉筋漏原因氣血壅滯染觸毒蟲含靈之毒而名其因治則一也在疔則有穿腸穿腎穿陰者又有無痔肝

門左右別生二竅流出膿血名為單漏竅在皮膚者易愈機斷損者難治又有原有痔漏肝邊別生一塊依膿就在

拜孔出若乃食積初濕熱久濕寒痔止出血在終是熱注下也宜連魏散

久是濕寒初起淡紅微腫小核宜寒血清熱燥濕牽牛酒

加味槐角丸職頭丸古枳巴九連歸丸久則內如藕白外

如黑腐淫虫惡臭宜澁竅殺虫溫補黑玉丹釣腸丸苦歸

九苦參九蠟發丸又有初起因風冷者久則虛而挾濕熱

者六補氣血兼艾灸薰洗平肌寒竅端十全大補湯補中

湯主之丹溪用參朮黃芪芎歸為君佐以蜥皮蛇退牛角

膠蜂房之類服之外用津唾調附子末作餅如錢厚放

上漏大姓大漏小姓小灸令微熱不可令痛乾則易新

耳灸如倦暫止次日又灸直至肉平為度外用雲母膏貼

之畏灸者內生肌丸最妙他如熏洗方齒髮散蜂房散

平肌塞竅取膿取虫諸方粗實者酌用清貴者慎之

陰瘡三等屬腎肝濕瘡風濕痒如癬濕陰瘡由腎虛風濕

成瘡侵淫汁妬精作白腫痛痒妬精瘡因久曠房室思色

出狀如赤癰動慾以致敗精流入莖內

初發如粟赤腫潰爛作白痛痒如悶陰蝕華丸腫相連陰蝕瘡因婦人子宮

未淨與之交合房室後又未洗浴男子腎虛邪穢滯氣遂令陰莖連舉九腫痛小便如淋甚久潰爛成

下疳經久潰爛侵蝕肌肉血出不止以成下疳瘡寒熱煩

渴宜詳辨非虛便是濕熱侵身體煩熱壯熱惡寒宜急治

湯加參朮芎歸腫痛發熱若四物湯加柴胡山梔濕熱腫

痛建裂寒熱者小柴胡湯加龍膽草黃連青皮熱勝二便

秘者八正散濕熱甚則腫痛濕溢及莖痛縱痔瘡或出白

津者龍膽瀉肝湯加氣虛者補中益氣湯加龍膽草山梔

煩渴不止者竹葉黃芩湯腫潰後氣血虛而有火者八物

湯加柴胡山梔無火大便軟者托裏散內托十宣散太要

此症肝經陰虛為本腫痛寒熱為標莖痒津出多脾熱中

宜常服腎氣丸若專治肝則誤矣金水以致肝經血虛

弄出白津多因脾土軟弱不能滋生火燥宜補中益氣湯與清心蓮子飲間服蓋脾胃為肝腎

之源心實主之○外治濕陰瘡，柏蛤散，銅綠散，如精瘡，津
調散，黃腦散，除蝕瘡，鳳衣散，下疳瘡，旱螺散，玉莖破，列，腫
痛者，驚管散，爛鼻，成瘻者，截痔散，或用洗藥，腎莖上生瘻
久不合口者，用經布燒灰，蜜調塗，上即愈，有陰毛間生，至
作痒者，搗桃
仁泥塗之

陰囊癰，屬肝腎經，都緣陰虛濕熱并

升溪云，但以濕熱入肝，施治而佐以補陰

難清脫，溺澀，清肝利濕毒

初起腫赤，脹痛，小便澀滯，寒熱，作渴，當清肝火，分消濕熱，以溫

宜黑龍湯，吞滋腎丸，如全因入房，囊腫大如斗許，小腹痛，悶，溺澀發熱，口乾，痰壅，命在反掌，宜腎氣丸，料加車前子，牛膝煎，吞滋腎丸，滲利濕熱，後仍腫痛者，宜補陰托裏，以速其膿，而針之，若膿掀而便秘者，熱毒壅滯也，宜托裏清毒散，或又不減者，熱毒未解也，宜潰後托裏補陰精，皮脫

畢九懸掛，或內見筋一條，不消，陰囊悉腐，玉莖下面，則囊亦腐如半，邊筆管只宜托裏散，加故紙，黃芪，五味子，兔

絲子或四物湯加參朮吞腎氣丸兼服補中益氣湯倍參
芪歸朮大補氣血脾胃切忌寒涼攻伐及淡滲損陰之藥
外塗白蠟膏囊甚旬日可復雖曾去陰子亦無害又有因
水腫囊腫潰者見內科○陰囊兩傍生瘡濕痒甚者牡蠣
卅或連兩腿上生風濕瘡者硫磺散○小兒陰囊生瘡及
陰股間汁出先痒後痛愈後復發先以火炙瘡拭去痂令
乾以蜜敷之却搜麝作餅炙熱乘
熱熨之冷則再灸再熨以愈為度

婦人陰瘡瘡火致損傷肝脾濕熱注如蛇如菌如鷄冠生

虫腫痛痒脫墜陰戶生瘡乃七情鬱火傷損肝脾濕熱下注○陰中挺出一條尺許如蛇痛墜出水

濁溢者朝服補中益氣湯晚服龍膽瀉肝湯外塗藜蘆膏
而收○陰中突出如菌如鷄冠四圍腫痛者乃肝鬱脾虛
下陷先以補中益氣湯如山梔茯苓車前子青皮以清肝
火兼升肝氣漸愈更以歸脾湯如山梔茯苓川芎調理外
塗藜蘆膏○陰戶突因勞力者血虛四物湯加龍骨氣虛
補中益氣湯○陰中生虫墜如小蛆者乃濕熱甚而心氣

又醫氣血凝滯而生宜薑香養胃湯補心湯古疏鯉片外

用生艾叶調雞黃末燒烟薰之更用雄黃散散納陰中○

陰中生細虫并不可忍食入臟腑即死令入發寒熱與癆

症相似先以蛇床子煎湯洗淨拭乾後用梓樹皮焙乾為

末入枯礬四分之一麝香少許敷之立效○陰戶兩旁腫

痛手足不能舒伸者用四季葱入乳香末同搗成餅安陰

中立效○陰腫痛極便秘欲死若枳橘殼但腫痛者四物

湯加柴胡山桅牡丹皮龍膽草如時常陰痛者四物湯加

藥本防風○陰戶腫痛不閉者逍遙散十全大補湯腫消

不閉者補中益氣湯腫墜者加山桅牡丹皮○濕痒出水

又痛者憂思過也歸脾湯加柴胡山桅

牡丹芍藥生甘草○潰爛者逍遙散

食少胃滿尿澀滯陰戶腫痛不閉寒熱溺滯體倦少食者

補中益氣湯加升麻柴胡至一錢量入

茯苓山桅○陰戶不閉小便淋瀝腹中下物又有交接血

攻動脹痛者逍遙散加柴胡山桅車前子

即來涼藥房勞當禁忌交接出血乃房室有傷肝脾虛不

藏血補中益氣湯外用熟艾皂裹

入陰中或月經髮青皮燒灰敷之若
此血過多見雜症皆謂諸肝脾自愈

附骨疽毒深着骨賊風石緩不可忽賊風得熱痛少寬

因風邪搏於骨髓故其痛亦微骨過寒則甚外症惡寒有
汗痛處常欲熱熨失治變為癰曲偏枯宜桂枝湯主之

緩慢色黯石硬石緩疽石疽皆寒氣伏於骨髓但緩疽其
熱緩慢色黯黯久則皮肉俱爛石疽腫

與皮肉相似疼痛堅硬如石初起
便宜溫熱托裏補虛次乃隨症調治

附疽肉痛真如錐

外肉全無赤腫突如人多因冷露侵濕熱瘀火壅家發

因露卧風寒寒濕鬱深者初起痛不能轉寒熱無汗經反

寒鬱為熱便秘者漏蘆飲子主之有不敢下者須分經內

托汗散在元腎者內托羌活湯腿內近膝股漫腫木硬者

內托羌活湯腿外者內托酒煎湯左腿外側漫腫長溜行

步步痛以手按至骨大痛者黃連消毒散通用積蘇散敗

毒散○內傷厚味及勞役與酒後乘涼浴水邪入脾樞環

跳穴左右積痰瘀血搏成宜青草蒼柏湯微汗服此不愈
恐疽將成者急掘地坑用火燒紅沃以小便令患者赤體
坐其上以被席圍抱下截使熱氣薰蒸熱理開氣血暢而
愈○內傷生冷飲食寒涼藥物血凝於內飲食如常活命
飲食少體倦者六君子湯加當歸藿香如因勞役傷食右
腿偏腫者補中益氣湯○內傷鬱熱腫痛如雖赤軍散漫
先用活命飲次用八物湯加柴胡牡丹皮山梔○內傷勞
役兩腿腫痛寒熱食少此濕痰下注也補中益氣湯加平
夏茯苓為藥○內傷房室兩腎腫硬二便不通者腎氣丸
料加車前子牛膝煎服兼用十全大補湯有寒熱者道地
散○抑考附疽初起宜青皮甘草節二味煎服以行其氣
或灸發是處若膿已成即用火針使毒不得內潰帶生用
亦無妨且不痛又易斂口○附骨疽慢腫光色者用蜂房
蛇退頭髮灰各等分為末每三錢酒調服或神應膏為丸
梧子大每三十丸溫酒下外仍貼之已潰者用平肌散或
狗頭骨燒烟薰之魚眼瘡亦妙○腿上一切寒濕瘡用鰵
子糞煨過為末乾糝如燥痛加黃丹少
計桐油調敷凡癰疽生伏兔穴者不治

杖瘡

破瘀止其疼

定心補益是後節

杖瘡於法本不當治據古方破瘀去血為先一杖畢即飲童便和酒不可喫茶

免血攻心待神氣定後體盛者用鷄鳴散下之體薄者瘡

攻寒熱惡心少食宜當歸鬚散加柴胡羌活氣鬱加木香

心腹脹痛加重便心下脹滿氣不通暢加木香檳榔外用

熱豆腐鋪在林處其氣如蒸其腐自紫後以熱豆腐鋪之

以紫肉散盡淡紅為度出膿血潰爛者亦宜甚者內服乳

香定痛散隨以熱酒盡量而飲風者潰後宜大補氣血脾

胃兼吞紫河車并最易平復外貼黃蠟膏馬齒膏

足膝部

鶴膝風

人面瘡

腎臟風瘡

腫瘡

脚跟瘡

脚肚瘡

及裕口瘡

脚發

軟甲瘡

脚指丫瘡

鶴膝風如鶴之膝三陰虧損風邪入

足三陰虧損風邪乘之以致內熱減食肌

瘦其體癢痛久則膝愈大而腿愈細有知鶴之膝然初起

宜用葱熨法以內消之寒熱者五積交加散加烏藥羌活

已潰者獨治寄亦有虛火陰血枯所以痢後多此疾陽虛熱來

生湯大防風湯復去者無根虛火也十全大補湯大防風湯臍腹疼痛瀉

瀉頭暈吐痰者八味丸發熱大渴面赤脉大血虛甚也古

歸芪湯○陰虛形瘦發熱者腎氣丸挾濕熱者蒼朮丸二

炒蒼柏散食少面黃者六君子湯津乾中氣不足者補中

益氣湯加五味子腰膝肌肉不生者八物湯○婦人月經

不調發熱口渴兩膝腫痛者腎氣丸蒼朮丸逍遙散加牛

膝梓仲黃柏人面相傳積業窻貝母一施湊使出瘡象人面眼

膝上亦有臂患之者據方書皆云窻業所至須清心悔過

內服十不味流氣散又者大苦參丸腎氣丸外用貝母為

未敷之乃聚眉眼口仍用生肌散占而愈

腎臟風瘡有如癰初起脛上遍身攻此非膿瘡亦非外腎

燥或思色精不出而內敗初起兩足時熱脚跟作痛多於

內脛上痒極抓破成瘡久則能漸延開失治延及腿

風瘡乃腎虛有火血

服遍身 外症瘰癧滴膿水內症潮汗痰倦如 內症哺熱卒

者有之 吐痰體瘦腰脚倦怠治以腎氣丸為主佐以四生散若脾

胃虛者補中益氣湯為主佐以腎氣丸四生散又有遍身

生瘡膿水淋漓兩腿尤甚體倦作痒經年不愈乃腎虛

火也八味丸主之 外治謝傳傷手瘡方白膠香散

腫痛濕熱甚 生兩腫上初起炊腫作痛寒熱者屬外

熱者活 邪濕熱積蘇散敗毒散主之毒盛發寒

命食 慢腫寒熱陰分虧 慢腫作痛或不腫不痛屬三陰

全大補湯脾虛挾表邪者補中益氣湯加桔梗白芷脾虛

濕熱流膿口乾少食者補中益氣湯加茯苓藥瞞熱加

妙黑黃柏熟地挾熱氣加山施川芎有熱者歸脾湯加山

施柴胡若患虛黑黧肢體惡寒飲食少思者屬脾腎虛敗

宜八味丸內熱口乾者腎氣丸久不愈 外足三陽需外治

內足三陰更難醫

外治外腫者因風濕者洗以葱湯次用

土膏因血氣凝滯者小駐車丸加乳香少許糝之○肉腫
瘡初起洗以鹽湯次以蠟替紙貼之重者桐油膏厚甚時
蠟膏久不愈者內外通用蠟灰膏點去瘰肉後貼黃
蠟膏然內必量體服藥若誤用攻伐傷胃者亦能殺人

腳跟瘡乃督腎部內因虧損足三陰

腳跟乃督腎發源腎經過腓內因飲食起

居虧損足三陰所致或初必脚軟并跟痛一味滋補免侵
外被犬兔所咬而成

事慢腫食少者補中益氣湯補熱頭昏者逍遙散腎氣丸
咳嗽吐痰者十全大補湯八味丸久不斂口痛盡氣血

而死○脚肚上生瘡初如粟漸大抓搔不已成片包脚相
交黃水流出血不可忍久成痼疾難愈先用貫衆煎湯洗

洗後用百藥煎為末津唾調逐旋塗敷自外而入○袴口
瘡生於脚脛或因物打撲而成其瘡口狹皮內極潤皮薄

如竹膜極痒痛終日黃水流延蔓而生甚者數十年不愈
又易於染人患者須忌房室則易愈用韭菜地乾地龍屎

為末入輕粉清油或白犬
血調敷內外腫瘡亦治

脚發足心或縫間三陽易治三陰難生足掌或足指縫間

足三陽濕熱下注易治微赤微腫膿清者屬足三陰腐損難治若黑黯不腫痛不潰膿煩熱夜痛小便淋瀝者陰敗

未傳惡湧泉發熱乃其兆冬時發降可保安治法濕熱下

症不治蒜灸及活命飲以鮮薑煮次服補中益氣湯腎氣丸以補

精氣三陰虛者初起托裏消毒散或托裏散加牛膝檀香

杜仲或托裏消毒散後大防風湯十全大補湯八味丸

陰虛足心熱者四物湯加知母黃柏脾虛者補中益氣湯

若事治又有**軟甲**不能行五指濕爛如湯潑**軟甲**因靴窄

入四邊腫爛黃水流注浸淫相染五指濕爛漸引上脚

跌疽漿四足如湯潑火燒日夜倍增不能行動以陳皮濃

燒灰粉之。又方用細茶嚼爛敷之。因暑手抵兩脚爛瘡亦宜能解熱燥故也。○指縫瘡疥成瘡血出不止用多年糞桶編篾燒灰敷之。○脚上及指縫中沙瘡用燕窠泥畧炒黃柏二味為末香油調敷痛者加乳香。

脚背發必兼消渴輕者赤痛猶可活重潰色黑名脫疽甚

重筋骨寧斬割 脚背發又多脫疽疔以其能潰脫也亦有患於手背及手指者原因膏深房室損傷

脾腎或先渴而後發或先發而後渴輕者色赤作痛自潰可治先用隔蒜灸內服活命飲或敗毒散加金銀花白芷

大黃痛止乃與托裏散或內托十宣散去桂加天花粉金

銀花挾氣者十六味流氣飲下虛者十全大補湯八味丸

大苦參丸。○重者色黯不痛先用隔蒜灸桑枝灸更服補

藥因內則惡肉不致上侵庶可保生又有內修手足口咬

等傷或外塗生肌膏藥內服代兼犯房室患處不潰不

流血膿上延亦多致須用利刀解去其筋則筋骨

出而毒得泄又甚在指則斬去其指在肉則割去其肉外

用油及無名異煎下沸入花椒丁勻看瘡大小剪藥

藥在內同煎浸一七後
單以此藥貼瘡上即安

○遍身部

五疥 五癰 血風瘡 癩風 楊梅瘡
疥瘡 多骨疽 翻花瘡 流注 瘰
癧 暑熱瘡 痲痺瘡 寒冷瘡 侵淫瘡

凍瘡 手足皸 蝨瘡 癰瘡 肥瘡 疥瘡
白蛇纏 湯火瘡 折傷 破傷風 抗瘡

漆瘡 竹木刺

五疥

乾濕玉砂膿

五疥由五臟蘊毒而發，屬足三陰者尤多，便秘為實，利虛風。

瘡有遍體難分，經絡必憑外症以斷。虛實癰腫作痛便秘，硬發熱者為風毒濕熱，癰腫作痛熱或時寒熱，體倦少食便順利者為血虛風熱。乾疥癢痒，肺燥其乾，疥癢痒皮枯屑起，便秘清涼飲古荆黃湯搜風順氣，凡久者天門冬膏便利，若為相火鬱於肺，活血潤燥生津飲或四物湯加黃芩連翹天門冬，久者腎氣丸，久虛古烏荆丸如素，有肺風而止多粉刺者，樟皮散。濕毒暑腫，脾胃攻疥。

脾經作痛久則水流如黑豆汁便秘者為脾鬱濕熱毒防

風通聖散俱酒蒸或炒大黃另用酒煨炒三次木鱉子

或升麻葛根湯加天麻蟬退氣滯復元通氣散濕勝者除

濕丹便利者為脾虛熱補中益氣湯量加參連清熱芳

正燥濕胃火作渴者竹葉黃芪湯脾鬱盜汗不寐者歸脾

湯瀉瀉腹脹者胃苓湯加黃連久者二炒蒼朮九濕勝單

茶末青脾肺風砂細作疼心血滯砂瘕如砂子細箇或痛

毒者何首烏散砂細作疼心血滯或痒搔之有水撒赤乃

心血凝滯便秘者當歸丸或赤暈散合四物湯久者酒蒸

黃連九胃煩多痰者牛黃清心丸心煩口乾小便不利者

連翹飲便利者活血五苓如癰肝火衝火盛生虫即腐草

四物湯久者當歸飲五苓如癰肝火衝為黃連散五苓瘕

不短痛延曼易於傳染便秘者肝風熱甚蘆薈丸或敗毒

散磨羚羊角汁刺之久者古聖丸便利者肝經火鬱道

遙散磨羚羊角汁刺之久不愈者胡麻腰窠炊痛脾瘕

散但諸瘕久則生虫須兼治敷洗腰窠炊痛脾瘕

痛慢症火腎不充含漿獨膿色厚煖痛便秘者為濕熱五

香連湯湯升麻和氣飲或竹葉不苦

合四物湯含漿膿清色淡不痛便利者為腎虛火入更分
味逍遙散或八物湯加知母黃柏或四生散散腎氣丸

上下與肥瘦 上體多兼風熱下體多兼風濕肥人多風濕
瘦人多血熱瘦弱虛損腎枯火炎綠有便欬

受熱作渴等症只宜滋陰降火畧加秦艽蒼耳通翹之類
決不可純用風藥寒血傷胃因皮膚之疾而壞臟腑者有

之通用連翹湯氣虛四君子湯血虛八寶丹開鬱退熱殺其五
合四物湯風合消毒飲熱合平胃散

殺須辛溫吳萸白芷之類退肌熱須苦寒秦連大黃之類
殺須水銀之類此丹溪外治三法也乾疥吳萸黃連或

黃連太黃為末猪膽汁調搽濕疥一上散砂疥剪其皮散
疥積積斷膿築三黃散通用摩風膏洗藥用荆芥黃柏苦

參等分煎湯加煎加蛇床子川椒腫加葱白

玉癰濕頑風馬牛總皆血熱肺邪留 疥癩皆血熱濕燥以

淺者為疥深流者為癰疥多按熱癰多按熱疥多按熱癰多按熱
身癰則肌肉應疹或圓或斜或如舌者走散風癰即乾癰

搔之則有白屑濕癬如虫行搔之則有汁出頑癬全然不
知痛痒牛癬如牛頸皮厚且堅馬癬微痒白癬如連又曰
癬清熱殺虫祛風濕又則補腎自然收諸風濕中癬與疥
癩大同初起有可

下者打散去黃連金銀花穿山甲芒硝加赤芍白芍水
酒各半煎臨熟入大黃露一宿五更服有可汗者四物湯
加荆芥蘇黃各五錢淨洗一二兩葱豉煎服重汗一切癬癰
皆効經久不效汗下者只用防風通聖散去硝黃加浮萍
皂刺小煎服久年不愈者非吞頑癬九或古龍犀丹
用何自烏白芷蘇木等分入猪油及鹽少許浸酒送下體
虛者不可妄用風藥氣虛者何首烏散消風散血燥者四
聖不老丹或腎氣丸久服自効有虫者俱宜間服

○外治乾癬用狼毒草烏各二錢半瑤硫七枚生為末津
唾調搽○濕癬用枯礬黃連各五錢胡粉黃丹水銀各二
錢為末用猪脂油二兩夾研令水銀星散盡微罐收貯
之○牛癬用舊皮鞋底燒存性入輕粉少許為末麻油調
敷○馬疥癬用馬鞭草不犯鐵器搗自然汁半盞飲盡十
日即愈○通用麻油二兩入巴豆草麻子各十四粒

七粒熬煎三味枯黑去查却八白蠟五錢蘆薈末三錢攪
勻磁罐收貯括破塗之或用川槿皮浙剪草木鱉子等分
為末醋調敷○洗藥用煎蘇樟腦蒼耳浮萍煎湯

血風血燥風熱鬱初發疥瘡或如丹瘡痒挑破痛有水毒

投風藥血益慳血風瘡乃三陰經風熱鬱火血燥所致瘡
痒不常挑破成瘡膿水淋漓內症暗熱盜

汗惡寒少食體倦所以不敢妄用風藥大藥肝風血燥寒

熱作痛者常歸飲加柴胡山梔痛痒寒熱者小柴胡湯加

山梔黃連夜熱諸語者小柴胡湯加生地肝脾鬱火食少

寒熱者八味消痞散脾虛暗熱汗不寐者歸脾湯加山

梔熟地既虛有熱作渴咳嗽痰喘腎氣丸通身癢四物

湯加浮萍黃芩等分其甚者紫雲膏凡疥瘡三劑兩足

痛痒者當歸拈痛湯如因飲酒後過身痒如風者拭至出

血又痛者用蟬退薄荷等分為末每二錢水酒調服凡身

發痒者通用○外治

瘡腫甚大馬齒莧

癰疽審因分上下

癰即肉經腐敗受天地間肅殺風氣結

烈暴悍最爲可畏一因風寒或汗出解

衣入水或酒後當風二因濕毒或坐卧濕地或月雨露三

因傳染然未必皆由外也內傷飲食熱毒過甚太寒太熱

房勞穢汚以致火動血熱更加外感風寒外感而發初起

身上虛痒或起白屑累累如癰風然或發紫疱疔瘡流膿

上先見者氣分受病上體必多下先見者血分受病下體

必多上下俱見者氣血俱病從上而下者爲順風從下而

上者爲逆風但從上從下以漸來者可治頓發者難愈治

失其法以致皮死麻木不仁脉死血潰成膿肉死割切不

痛筋死手足緩縱骨死鼻梁崩塌與夫眉落眼昏唇翻聲

噎甚則蝕傷眼目腐爛玉莖擎拳肢體病至於此天刑難

解

總之陽明血熱化熱甚癰瘡腐爲重追重取涎藥必伯

胃與大腸無物不受脾主肌肉肺主皮毛然瘡癰雖見於

皮肉而熱毒必歸於腸胃故法必先治陽明初起宜防底

通聖散在上用麻黃以去外毒在下用硝黃以去內毒上

下俱見者用正料防風通聖散以解表攻裏三五日後即

服解仙散以吐惡涎服後又服防風通聖散去硝黃麻黃
多服久服待胃氣稍定用再造散以下其氣又有宜先下
虫而後吐涎者吐下後仍以防風通聖散量加
參芪熟地以固氣血或脾胃弱者白朮當倍用
庚巳蝕臟

壞五形諸肝涼血火瀉瀉外瘡涎蔓內虫攻注蝕肝胃脫

蝕心足底穿蝕脾聲啞蝕肺鼻崩蝕腎耳鳴如雷宜先服

瀉青丸以瀉肝火次隨症救治虛痒者四物湯加酒李調

浮萍未痒甚加荆芥蟬退搔痒皮皴自屑者白芷蛇九眉

落髮者三蛇卅或柏葉煎眉脫鼻淵者換乳最補宗瀉榮

湯蝕眼者蘆薈丸肢節廢者蠲痺散通風透骨花散胡麻

散加味苦參丸太楓丸換骨丸太麻丸紫雲風丸活神

丹腎氣丸四聖不老丹八物湯外治瘡風膏浴藥方髮落

下生者先用生薑擦三次後用半夏為末麻油調搽更與

四卷末鬚一
髮條參看

楊梅瘡因風濕熱或傷氣分或傷血
同多由肝腎脾內風

濕熱之毒間有天行濕毒傳染但各俗呼名不一
梅為天疱者有呼楊梅為大麻風者以理推之如楊梅
嫩紅爛痒痛屬心多生乳脇形如鼓釘黃豆者屬脾多
生諸面謂之大風痘形如絲花屬肺多生毛髮形如葡萄
萄按之緊痛者屬肝腎多叢生脉腎及筋骨之處形如魚
泡內多白水按之不緊者謂之天疱瘡以此類之輕者如
發於鬢額口鼻穀道邊者屬陽明及少陽太陽如發於足
脛陰莖脇肋者屬肝腎及太陰太拙上先見者氣分受病
上體必多下先見者血分受病下初宜疎瀉又補虛免成
體必多上下俱見者氣血俱病

癰癤與漏缺 初起即服防風通聖散一貼去麻黃用確黃
以去內毒待胃氣稍定再服一貼去補黃用

麻黃發汗以去外毒以後用加減通聖散九多服此方內
通臟腑外發經絡為首尾要藥輕者服此一劑更加搽洗
足矣重者十貼後宜服化毒散二日却用改藥三日癰乾
痂欲脫落丹服化毒散二日後量用防風通聖散加減上
體多者兼服敗毒散加荆防鈎藤下體多者兼服龍膽
肝湯從鼻準腫起通身生瘡面上尤多者梓皮散便瘰癧

搜風順氣丸以此調理斷根○失治久則風毒深入經絡
挾濕而成頑癰或氣血虛敗而成漏或誤服輕粉水銀及
不遵禁戒而成風堆腫爛流膿出汁謂之癰病至於此亦
有蝕傷眼鼻腐爛玉莖拳掌肢體與癰無異治宜消毒兼
以補虛○消毒頑癰者皂角丸筋骨痛者皂刺丸換骨丸
成漏者象牙丸腫塊者仙遺糧丸通用加味苦參丸大楓
丸○若患卑苦參酒○消毒補虛仙遺糧湯加鈞藤或補
氣瀉營湯胡麻散○補虛氣虛者單人參湯補中益氣湯
血虛者四物湯加山拖鈞藤金銀花甘草節或腎氣丸四
聖不若丹氣血俱虛者八物湯八味丸單仙遺糧丸○外
貼太乙膏
白蠟膏

疔瘡全是飲食毒發因灾畜暴疹傷

經曰膏粱之變足生
大疔恣食辛辣厚味

久火燁腥葷及誤食自死禽獸蘊毒於中而即發者有之或
卒遇大風太霧大暑大寒天地暴疹之氣襲注經絡觸動
其毒而發者或因感死畜蛇虫毒氣而發者其死尤速初
發或因衣物觸着而疼痛忽生或因發疹抓破而成疱僅

一、小瘡殺入一二日，
間北之癰疽尤毒。

生於四肢及頭面

疔發無定處，或有背腰尤緩，在頭面

耳鼻口目舌根唇上及手足骨節間者，最急如生，兩足多有紅絲至臍，生兩手多有紅絲至心，生唇面口內多有紅絲入喉者，俱難治，須急看以針挑撥，其絲出血以泄其毒氣，方可保生。

黑腫爛透深孔，形色不一，極痛痒。

瘡頭黑硬如釘，四畔赤如火盤，根突起寸餘。

隨變焦黑，未幾腫大而光，轉為濕爛，深孔透肌如大針穿之狀，其形初起大小不一，或如水泡，如吳黃如豆如石榴子，其色有五，內經分應五臟，各有所屬，部位局別：一、三、種一麻子疔狀如黍米稍黑，忌麻仁麻衣，二、石疔如黑豆甚硬，忌瓦礫磚石，三、雄疔四畔仰抱，發起色黃大如錢，孔四雌疔四面抱，發起心凹，色稍黃如錢，孔俱忌房室，五、火疔狀如湯火燒，四畔有煙焰，忌火燒烙，六、爛疔色稍黑膿水流出，忌沸湯熱食爛物，七、二十六疔狀如黑豆，今日生一，明日生二，及滿三十六數，即死，忌嗅然入蛇眼疔狀如蛇眼，忌惡眼人及嫉妬人見，九、鹽膚疔狀大如匙，面色

赤中有黑粒忌食鹽十水洗疔狀大如錢頭白裏黑汁出
中硬忌飲漿水水洗渡河十一刀鑊疔狀如薤葉大長一
寸肉黑如燒烙忌刺及刀鑊切割十二浮瀰疔其狀曲圓
少許不合大如薤葉內黃外黑黑處刺之不痛黃處刺之
痛十三牛狗疔色赤疱起搗不破已上皆宜依法將護若
或觸化則脊強瘡痛不可忍惟浮瀰牛狗無忌不治自愈
○又有一種魚臍疔瘡頭黑深形如魚臍破之黃水滲出
四畔浮漿其毒尤甚用絲瓜葉連鬚葱韭葉搗爛以酒和
服其查貼腋下如病在左手貼左腋下在左足貼左膝下
右手足同在中貼心臍並用布縛住候肉下紅絲處皆白
則安有潮熱者亦宜却令人抱住恐其顛倒則難治或
用乾退燒灰鷄子清調敷○一種水疔瘡用黃荊葉十四
片獨頭蒜三十箇百草霜
二錢搗酒服取汗大効或不痛痒只麻木寒熱眼中流火
光牙關急緊時驚惕甚則嘔吐毒陷腸諸症惟嘔吐最危治分虛
實豁心火實者初服賽命丹二十九以葱酒發汗表症多者
追疔湯或敗毒散加蟬退姜蠶金銀花裏症多

若活命飲五聖湯便利弱瀉者黃連消毒散此散初起服之
之內消欲作膿者托裏消毒散○虛者初服保生錠子以
解毒或蟾肝丸有表邪不敢汗者補中益氣湯加防風白
芷裏症不敢下者蜂蛇散腫痛欲作膿者托裏散內托十
宣散不能潰者大料參芪歸朮補之或補中益氣湯合生
肌散以防毒陷○豁心氣者疔毒入心則神昏口乾煩悶
恍惚似醉嘔吐不定危症也實者用萬病解毒丹以黃連
當歸煎湯化下虛者用古苦歸湯加茯苓茯神遠志蓮肉
清之毒上攻心嘔者護心散有因服賽命丹吐者亦宜此
解之恍惚悶亂坐臥不寧煩渴身痛便秘者漏蘆飲子煩
躁作渴者竹葉黃芪湯○外治輕者單蟾酥為末以百粒
和黃冊搜作丸如麥米大用針挑破疔頭以一粒納入効
重者賽命丹危篤者提疔錠子**暴死灸法可回陽**凡暴死者多是疔毒急
宜急灸之并服賽命丹亦有復醒者如偏僻之處
藥難達惟灸有回生之功若事疎利表散者危
多骨疽由瘡久潰氣血不能營患處久則腐爛骨脫出只

補脾胃壯元氣

十全大補湯腎氣丸主之外以附子餅灸

瘡自斂若腎氣虧損其骨漸腫在背歲月潰膿出骨亦當

用葱熨法若長以葱代則真氣益虛邪氣益甚無不有誤

有上膊腫硬年餘方潰半載未愈內熱體倦作渴用補

中益氣湯腎氣丸元氣漸復出骨一塊仍服前藥而愈有

足背腫落一骨者有下

手背腫落一骨者

翻花瘡因瘡將斂元氣虛弱肝

或如蛇形長數寸內服補養脾胃藥

者用雄黃末敷之乃肝不能藏脾不能約也補中益氣湯加五味子麥門冬

或腎氣丸有惡火者八味逍遙散若用風藥速其亡也汗

外奎藜蘆膏要

日一易須候元氣漸復膿毒

灸其勢益甚或出血如注寒熱嘔吐等症急補脾胃為善

流注腫塊非等閑內傷外感濕痰干跌撲閃挫并產後氣

流血注四肢關

流者行也注者住也或結塊或慢腫皆因素有痰火或外感風寒邪氣流行至其痰

注之處而發或內傷鬱怒以致痰火驟發或內傷房室陰虛陽氣湊襲逆於肉理而成或內傷勞役飲食搏動而發或跌撲閃挫一時氣逆血凝而成或產後惡露未盡復被感傷凝注多生四肢或胃腹腰脅關節之處初起宜葱熨法實者十六味流氣飲敗毒散痰痛便秘者古半硝丸服者二陳四物湯托裏益氣湯不換金正氣散六君子湯加芍歸補中益氣湯加木香枳壳選用今其自潰自消若潰久不斂者縱有表邪只托裏為主十全大補湯人參養榮湯補中益氣湯托裏抑青湯托裏益氣湯八味丸更佐以豆豉餅琥珀膏散寒邪補接陽氣膿成以火針破之內有膿管以藥線腐之若過用寒涼者不治

瘰癧大如梅小如粟多生手指及臂足色變不常深入肌串

筋見骨痛至極

療疽一名蛇瘡烟瘡地面多有之先作點而後露肉四畔若牛唇黑硬小者如粟如

豆

癰者如梅如李發無定處或臂或臂或口齒或肚膈多

見

手足指間赤黑青白色變不常根深入肌走臂逆腫毒

血流注

貫串筋脉爛肉見骨出血極多令人串

痛狂言痛入於心即死突出於外腎者亦死

惡風積毒

血熱成煩燥

噤悶入心腹

原因感受惡風入於脉理或烟瘡地面傷寒瘡後及感觸蛇毒

所致

二十已後四十以前者皆積傷之毒入胃壅塞而成

四十已後六十以前乃血閉不行壅熱積血得之治宜宣

毒行血用瓜蒌根酒煎入乳香沒藥五靈脂皂刺等分以

下其毒次用清心行血之劑如係蛇毒赤足蜈蚣最妙雄

黃白芷次之或蠟塔石冷酒入醋送下外用荆芥白芷

川椒葱白煎湯入鹽俟湯溫自手臂上盪下日三次療疽

毒氣走腫所至處宜緊繫之自手發者毒走至心自足發

者毒走至腎不救各有小紅筋尋其筋之伴處灸三炷即

痊經云在指則截在肉則割恐毒氣入心入腹令人煩燥

嘔噎昏悶或瘡出青水穢汁者腎虛極也死人至速此瘡

極惡引風凡癰疽開一寸則一寸引風非必風入於其中
風邪襲虛則肉爛透骨惡血橫流宜南星半夏白芷稍量
能去風可以頻敷其諸瘡
理推廣癰疽未度行之

痼發手足或掌心或腰或臀毒何深無頭無面愈又發色

帶淡紅防漏慢凡瘡氣血相搏有頭有面風邪內作無頭
無面痼無頭面瘡裏開瘡低貼肌肉走注

牽連生於手足或掌心或腰腿或臀下伸縮之處初起渾
身壯熱手足不遂增寒頭痛虛渴多汗嘔逆四肢沉重較
之諸發煩渴為甚或腫毒已平數月後復於他處大發但
作肉色微帶淡紅終不能救大要培養內氣以防滑漏治
與癰疽類推外用神應膏貼之如瘡出米泔汁者必死

小小諸瘡風毒滯諸般小瘡皆因心腎不交飲食不節腸
胃停滯以致風熱寒濕之毒與氣血相

搏凝滯肌肉之間而發露也暑癰凍裂手足
夏暑心火神熱燥熱逼汗漬成瘡遍身或出膿血

赤臘如灰用真星半夏黃連黃柏各一錢五倍子黃丹各
五分爲末並粉如痒加枯礬雄黃常服黃連阿膠丸以清
心○熱汗浸漬成瘡痒痛不止用黃芪當歸防風荆芥穗
地骨皮木通各二錢白礬一兩爲末每藥一兩水二升碗
煎五六沸去渣大煮熱淋洗患處乾避風少時立効輕
者只用礬雪水和蛤粉粉之○癰疽瘡因汗出見熱而生
輕者狀如粟用青膏煎湯洗之或棗葉亦好重者熱汗
浸漬厚成瘡用黃豆滑石各五錢爲末熬熟攤之瘡破
成瘡加黃柏棗葉各五錢片腦少許○冬月手足身觸寒
冷血凝生瘡頑滯不知痛痒內服升麻和氣飲去太黃外
用木香檳榔黃吳茱萸黃蘗香爲末麻油調搽○凍瘡
先痒後痛然後腫破出血黃水不止用雄雞腦一枚搗
爛黃蠟各等分清油裁半同於慢火上熬成膏去渣塗之
久不愈者亦效又方用半附子爲末酒煮之○手足折
裂作痛用清油五錢慢火煎沸入黃連一兩再煎溶入水
粉五兩末各少許熬紫色爲度先以熱水泡手足火上烘
乾後用藥敷以紙貼之其痛立止入水亦不落或相油膏
塗之亦好○手足皸先用百沸湯泡洗皮軟拭乾然後用

癰疽二兩 共熬勻敷之或用五倍子為末牛骨
髓調磁鐵收貯埋地中七日取出填敷中即愈或黃蠟膏

好補塞

蝮蛇侵淫

白蛇蟻

蝮蛇生手足間相對如新菜

有孔如蟻久而生蟲用杏仁乳香各三錢硫黃輕粉各一
錢半為末用麻油三錢入黃蠟五錢溶化入前末煎攪成
膏去火毒磁器收用又方用燕窠取抱子處土為末乾糝
先用白芷大腹皮煎湯洗淨然後敷藥○走皮癰瘡生滿
頰項癰如豆痔瘡而多紅延蔓過耳內外濕爛如浸淫瘡
之狀生片桑寄生桑葉皮各一握白芷黃連各小許煎湯
以熟洗候乾土出盡找乾次用皂莢麻竹箬俱燒存性
黃芩黃連樟葉白芷各等分為末麻油調搽神效忌醋○
手癰瘡用皂角粉輕粉黃柏黃連為末敷之○小兒胎
癰頭生紅餅瘡先用生艾白芷木腹皮葱白煎湯洗淨拭
乾次用生藍葉生艾葉入蜜搗膏敷之亦治惡瘡○侵淫
瘡初生甚小先痒後痛汁出侵淫濕爛肌肉延至遍身若
從口發出瘡四股者輕從四股發生然後入口者重用
苦練根晒乾燒存性為末猪脂調敷則乾瘡先用苦參

大腹皮煎湯洗之○白蛇纏瘡有頭尾像似蛇形初起宜
隔蒜於七寸上灸之仍用雄黃為末醋調敷之仍以酒調
服之或萬病解毒丹
湯火肥疔漆刺身
湯火燒瘡初時
宜強忍痛急向火

灸慎勿以冷物熨之使熱不能出爛人筋骨後用寒水石
土硫黃柏黃連黃芩山柃木黃赤石脂各一兩其若加水
片少許為末酒調或鴨子清調敷或陣王丹亦好○小兒
肥瘡用松香為末以紙捲成條香油浸燃之滴油搽或用
猪爪煑灰麻油調搽○疔瘡如魚鱗瘡十日若一様多生
手足又各悔氣瘡宜艾灸初起者則餘者皆依此法○漆
瘡因見漆漆中毒面痒而腫遠眼微赤痒癢之隨起瘡
癰重者遍身如豆如否膿嫩作痛用生蠟取黃隨瘡大小
遍敷之或臘茶為末麻油調搽或柳葉冬用皮煎湯洗之
○竹木刺入肉不出單搗米膏貼之或頭垢或蟻蟻虫搗
爛敷之効或象
牙為末搽之

折傷先問出血否
折傷有損身體或墜跌打撲倒壓悶刺
氣血鬱逆而皮不破或金刃傷出血

外拾筋骨者可治內損臟腑未出攻之出則守未出血者

裏膜及破陰乎耳後者不治

瘀黃連降火白木和中三味用童便入酒煎服在上者宜

韭汁和明礬在下者可下血冷則凝不可飲冷水引血入

心即死消痰鷄鳴散花蓋石散順氣木香勻氣散加童便

紅變或紅酒已出血者急用降王丹止血先服補托藥而

後消瘀虛甚者亦不攻下血虛者四物湯加穿山甲氣虛

者用蘇木參芪當歸陳皮甘草服半月脉散漸收方收以

煎藥調下自然斷木一味空心服之如骨不碎折者忌用

素虛損甚者不可用車丹去腐香但損傷妙在補氣血或被

寒冷若先服腰膝痛增熱寒折傷專主血論非如六淫七

宜是寒腰膝痛增熱寒情有在氣在血之分然肝主

血不問何經所傷惡血必漏於肝流於腦鬱於腹而作脹

痛或增寒熱實者下之虛者當歸續命散復元活血湯調之

或十全大補湯加香附最嫌嘔吐血出口凡損傷瘡口忽

陳皮貝母等分水煎服乾毒攻腹內諸

惚煩悶嘔吐及已出血多而又嘔血不止者難治初起嘔

吐者用平胃散為末內服外用薑汁調敷破傷風浮腫者

亦宜初起吐血用藕米煎湯調古烏附湯或古蚌霜散如
要血入腸胃下血濁如瘀血者用百草霜為末酒調服如
傷外腎小便出血貼敷定痛脉頰和如命門脉和緩關脉
不通者五苓散
門虛促而脫者雖傷淺難治凡血未出者脉宜洪大已出
血者脉忌洪大此折傷脉要也敷藥單糯米膏小兒散定
痛乳香定痛散夾脊法折傷後為接骨何人是妙手
四氣所侵手足疼痛者應痛丸
絡穴法骨髓明透而又有傳授故古
以危氏為善接骨紫金丹接骨丹

破傷

似症

中風有四因

四因百病皆然不因氣動者二卒暴

行有因氣動者二瘡口不合貼膏留孔風襲或熱鬱遍身
白痴瘡口閉塞氣難通泄傳播經絡燒燥真氣是以寒熱
間作甚則發瘡口噤禁角弓反張須臾欲死用蝎梢餅或
三生飲加天麻為末每一錢用黑豆淋酒調服化痰開關
風盛者下烏丸風痰俱盛者古星風散風痰虛者烏蛇散
血凝心神昏悶有單驚銀燒灰存性為末酒調服一錢服

佐 佐

後飲酒一二盞以助藥勢如血多痛甚者如聖散手足戰

掉者硃砂指甲散蟾蜍酒如頭目青黑額汗不流眼小目

瞪身汗如油治同傷寒表裏法風熱燥甚怫鬱在表善伸

者四逆不治治同傷寒表裏法數次筋脉拘急或時惡寒

或筋惕搐搦宜辛熱治風佐以辛寒如傷寒麻桂加黃芩

石羔知母是也若表不已軌傳入裏在肌肉者宜退風熱

開結滯辛寒之藥或佐以辛熱調之猶傷寒半表裏而用

小柴胡也若裏熱已甚而舌強口噤項背反張驚搐惕搦

涎壅稠粘胸腹滿塞便秘結或時汗出宜桂風散結寒

藥下之後復以清熱開結之藥調之又云破傷風同傷寒

壞症治看注何經太陽宜汗少陽和表症古防風湯去甘

而用本經藥祛之草加小芎獨活等分

水煎服或調蜈蚣散或九味羌活湯少用細辛加獨活等

分水煎服便秘加大黃緩緩通之或用古龍虎丹發汗亦

效半表裏陽明下之工中甲若服表藥過多臟腑和而

症甚麻湯自汗者白朮防風湯大汗

不止搐搦者升麻葛根湯加白朮黃芩如臟腑閉小便赤

自汗者先用小芎黃湯二三服後用大芎黃湯速下之或

紅標九氣弱者只用蜜酒法本是血疾易入陰或始而出血過多或瘡口早合瘀血停滯俱是

血分受病血屬陰五臟所主始雖在表隨即入裏故多死也宜養血當歸地黃湯活神丹托裏散內托十宣散以防

毒陷外用魚膠散或用鼻頭骨為末臘月猪脂調敷亦治狗咬又有破傷水瀝口緊強直者用牡蠣為末敷之仍

以甘草煎湯調服一二錢病痊又恐氣亦乏任是風邪不可攻只宜大

補令淡治或病已十分安痊而忽有口禁反張筋搐痰壅似破傷風症又似瘧症其實乃氣血俱虛也凡

癰疽潰後膿血大泄陽隨陰散變症只宜大補氣血果係風症亦不宜以風藥治之血虛者四物湯加參朮氣虛者

補中益氣湯去升柴陳皮加酒炒黑黃柏五味子麥門冬肉桂大劑服之氣血俱虛汗多作渴寒熱者十全大補湯

加桂附麥門冬五味子鉅逆者托裏溫中湯若刻換風藥者死

編註醫學入門外集卷之五

終

縣痒靜吾湯君
名建中贈刻

